

Aus der medizinischen Universitätsklinik Bonn.

Direktor: Prof. Dr. Martini.

Über den Erbgang der Dystrophia
musculorum progressiva anhand eigener
Sippenuntersuchungen.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Vorgelegt am 8. Dez. 1937.

von

Karl Arnold Bodarwe

aus Euskirchen.

B O N N 1938

Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Martini.
Korreferent: Prof. Dr. Pohlisch.



Die experimentelle Genetik bedient sich zur Festlegung der Vererbungsgesetze ausgedehnter Versuche an Pflanzen und niederen Tieren, die aufgrund ihrer schnellen Vermehrung Einblick in lange Generationenfolgen gewähren. Die hierbei gefundenen Erbgänge lassen sich sinngemäß auf menschliche Erbverhältnisse übertragen, und es läßt sich kein stichhaltiger Grund dafür anführen, daß der Mensch sich hier prinzipiell anders verhalten soll als Pflanze und Tier.

Nur die Methodik der Erbforschung beim Menschen weicht wesentlich von der bei Tieren üblichen ab. Da wir eigentlich erst seit drei Jahrzehnten eine moderne Erblehre haben, sind uns keine längeren, genügend erbbiologisch erforschten Generationsfolgen bekannt. Eine experimentelle Kreuzung — wie im Tierversuch — ist beim Menschen ja nicht möglich.

Wir sind hier also auf Analogieschlüsse aus dem Tierreich und auf statistisches Material angewiesen. Die praktisch wichtigste Methode der menschlichen Erbforschung ist neben der planmäßigen erbbiologischen Aufnahme der Inzuchtgebiete vor allem die Familienforschung, wenigstens wenn der Erbgang eines bestimmten Merkmals festgestellt werden soll. Angesichts der großen Menschenzahl ist anzunehmen, daß alle Kreuzungen, die von erbbiologischem Interesse sind, schon einmal stattgefunden haben; nur müssen sie im Gegensatz zum Tierexperiment, wo man sie willkürlich herbeiführt, aufgesucht werden. Diese Aufgabe fällt der Sippenforschung zu.

Besonders zu beachten ist jedoch, daß ein Versuch, in weit zurückliegende Generationen vorzudringen, schon wegen der Unzuverlässigkeit der vorliegenden Angaben über krankhafte Zustände, die meist nur mündlich überliefert sind, wenig ergebnisreich ist. (Nur in wenigen Teilen Deutschlands bringt das Standesamts- oder Kirchenregister wenigstens Angaben über die Todesursache.) Dazu kommt noch, daß ein Mensch mit seinen älteren Vorfahren einen weit geringeren Teil seiner Erbmasse gemeinsam hat als mit seinen Geschwistern. Deshalb bieten Geschwister und deren Kinder der Erbforschung

viel günstigere Unterlagen als vergangene Generationen. Praktisch wird man also bei der Untersuchung einer Familie in erbbiologischer Hinsicht besonders auf die Seitenlinien achten, da man diese noch untersuchen kann. Ältere Generationen sind nur mit den erwähnten Einschränkungen mitzuverwerten.

Tierexperimentell wurden die Erbgänge der Dominanz, der Rezessivität und geschlechtsgebundene Erbgänge gefunden. Wie die Erfahrung zeigte, gelten diese Erbgänge auch für die Vererbung menschlicher Eigenschaften und Krankheiten.

Die Dystrophia musculorum progressiva wurde von *Erb* scharf gegen die spinale Muskelathrophie abgegrenzt und als einheitliches Leiden beschrieben. Eine Erblichkeit will er nur bei bestimmten Formen der Muskeldystrophie gesehen haben. Es stellte sich aber bald heraus, daß die Erblichkeit allen Formen gemeinsam ist. Bei den meisten bekannten hereditären Leiden liegt der Erbgang fest. Bei der progressiven Muskeldystrophie hat man bis heute kein einheitliches Erbschema aufstellen können, das für alle Sippen gültig wäre. Die verschiedensten Erbgänge sind bei der Muskeldystrophie gefunden und beschrieben worden.

Diese Verschiedenheit der Ansichten mag zum Teil darin begründet sein, daß verschiedene Autoren sich bei der Aufstellung ihrer Thesen auf kurze Stammbäume stützten, denen vielleicht noch ganz unsichere Angaben zugrunde lagen, andere dagegen auf eine einzige sehr ausführlich untersuchte Sippe zurückgingen; die hierbei gefundenen Erbgesetze suchten sie dann auf alle anderen Sippen anzuwenden.

Zur Klärung der Frage, ob alle die für die Muskeldystrophie beschriebenen Erbgänge gültig sind und welchem Erbgange die progressive Muskeldystrophie am häufigsten folgt, bedarf es noch weiterer Materialsammlungen. Als solche ist auch die vorliegende Arbeit aufzufassen. Bei der Aufstellung der Stammbäume wurde besonders auf die Geschwister des Probanden und deren Kinder geachtet. Ältere Generationen, deren Daten nicht mehr mit Genauigkeit zu eruieren waren, wurden nur zur Aufdeckung eventueller Verwandtenehen herangezogen. Soweit möglich wurden die Probanden klinisch unter-

fucht, die übrigen Personen der Sippe wurden zu Haufe aufgefucht oder zum Teil durch Fragebogen und hausärztliches Gutachten erfaßt.

Im folgenden foll zur Darlegung der bestehenden gegenfätzlichen Ansichten zunächft eine Befprechung einiger Arbeiten über den Erbgang der Muskeldystrophie folgen.

Die erste umfaßende Arbeit, die fich unter Auswertung der bis dahin vorliegenden Literatur und Anwendung einiger Stammbäume mit dem Problem des Erbganges der Muskeldystrophie befaßt, ift die Veröffentlichung von *Weitz* aus dem Jahre 1921. *Weitz* legte feiner Arbeit ein Krankengut von zufammen 639 Fällen — teils aus der Literatur, teils aus eigenen Stammbäumen — zugrunde. Von diefen waren rund 62% fogenannte ifolierte Fälle, d. h. dem Unterfucher war in der Familie der Kranken kein weiteres Auftreten des gleichen Leidens bekannt. Auffallend ift, daß unter diefen fporadifchen Fällen vorwiegend Männer erkrankten; auch im Stammbaummateriäl überwog die Zahl der kranken Männer: in der gefamten damaligen Literatur findet *Weitz* das Verhältnis der kranken Männer zu Frauen von 476 zu 163. Die Krankheit befieł in den meiften Fällen von familiärem Auftreten ca. 50% der Kinder.

Aus diefem umfangreichen Materiäl fucht nun *Weitz* einen für alle Stammbäume gültigen Erbgang zu finden. Er ventiliert zuerft die Frage, ob eins der bekannten Erbfchemen der Dominanz, der Rezeffivität oder ein gefchlechtsgebundenes Schema anzuwenden fei. Ein dominanter Erbgang fcheint ihm häufig vorzukommen. Er fand in der Literatur 28, unter feinen eigenen 3 Stammbäume, die die Anforderungen der Dominanz erfüllten (er verlangte hierzu 50% der Kinder erkrankt). Andererfeits waren Stammbäume befchrieben, auf die dies nicht zutraf. So fand er 18mal eine Übertragung der Krankheit durch die gefunde Mutter, daneben traten 216 ifolierte Fälle auf. Die Tatfache, daß doch manchmal die gefunde Mutter als Überträgerin des Leidens auf ihre Söhne erfchien, brachte ihn zu einer Erörterung eines gefchlechtsgebundenen Erbganges. Er lehnt ihn aber fchließlicł ab, nicht zuletzt deshalb, weil ein folcher doch nur ganz felten beobachtet fei.

Die große Zahl der anscheinend ifolierten Fälle neben einer Reihe mit offenkundigem Erbgang fuchte *Weitz* folgendermaßen zu deuten: Die Krankheit entfteht durch Mutation, um ſich dann meift dominant zu vererben. Mit der Annahme häufiger Mutation — *Weitz* nimmt bei plötzlichem familiären Auftreten Maſſenmutation an — kann der Verfaſſer alle vorliegenden Fälle erklären. Die große Zahl der ifolierten Fälle läßt ſich gut in dieſe Theſe einpaſſen. Das von ihm beobachtete häufigere Auftreten der Erkrankung bei Männern braucht nach ſeiner Anſicht nicht durch eine geſchlechtsgebundene Vererbungsform bedingt zu ſein, ſondern er nimmt bei den Frauen Eigenſchaften an, die das phänotypiſche Offenbarwerden der vielleicht genotypiſch vorhandenen Anlage verhindern ſollen. Dieſe „Verhinderungsfaktoren“ könnten nach ſeiner Auffaſſung auch einem Erbgang folgen, dem er aber nicht weiter nachgeht. Im Jahre 1928 unterſtreicht er in einer Erwiderung an *Diehl, Hanſen, v. Ubich* dieſe Lehre noch einmal.

Die Letzteren lehnen Mutationen in der Häufigkeit, wie *Weitz* ſie fordert, ab. Weiter halten ſie einen geſchlechtsgebundenen Typ der Vererbung für nicht anwendbar. Nach dieſem Modus könnten kranke Frauen nur aus Ehen von Männern mit Konduktorinnen entſtehen; ſie wären demnach ſehr ſelten. Dem widerſprächen aber die eigenen Zahlen wie auch das Material von *Weitz*. In ihrer Arbeit hielten ſich kranke Männer und Frauen zahlenmäßig das Gleichgewicht. Nur bei den „ifolierten“ Fällen, die die Verfaſſer aber bei der Beurteilung der Frage des Erbganges der Muskeldystrophie nicht mit heranziehen, erkennen ſie das Überwiegen der erkrankten Männer den kranken Frauen gegenüber an. Dieſe Mehrheit ſei nach ihrer Meinung jedoch nur vorgetäuſcht. Die Männer ſeien eben durch Beruf und Wehrpflicht häufiger gezwungen, ſich dem Arzte vorzuſtellen, wobei auch leichtere Formen der Erkrankung aufgedeckt würden. Weiter fielen leichtere Grade bei der männlichen Berufsarbeit eher auf als bei der Hausarbeit der Frauen, die dazu geneigt wären, aus koſmetiſchen Gründen die Krankheit zu verbergen.

Verfaſſer kommen dann zu folgenden Ergebniſſen:

1. Eine geschlechtsgebundene Vererbung sei entschieden abzulehnen.
2. Eine geschlechtskontrollierte Vererbung (*Weitz*) sei theoretisch in beiden Geschlechtern denkbar; es liegt aber nach Ansicht der Verfasser kein Grund vor, sie für die progressive Muskeldystrophie anzunehmen, da die Zahl der Erkrankten bei beiden Geschlechtern gleich sei.
3. Einfache Dominanz entspräche auch nicht den Beobachtungen.
4. Mutationen in der von *Weitz* angegebenen Häufigkeit seien abzulehnen.

Nach Ansicht von *Diehl, Hansen, v. Ubisch* folgt die Muskeldystrophie einem dimer-dominanten Erbgang. Die Krankheit entstehe aus dem Zusammentreffen von zwei verschiedenen Faktoren C und D, die für sich allein unschädlich seien, doch wollen sie an Trägern dieser Erbfaktoren aus gewissen phänotypischen Zeichen auf die Anwesenheit des Faktors in der Erbmasse schließen können. Für diesen gefunden Träger eines der beiden Erbfaktoren prägen sie den Begriff des „Typs“. Es treten somit in den Stammbäumen drei verschiedene Gruppen auf:

1. Gefunde
2. Typen (ohne manifeste Krankheitszeichen)
3. Kranke.

Aus dieser Lehre ergibt sich also: Aus einer Ehe zweier phänotypisch gefunden Menschen, von denen jeder aber einen verschiedenen Faktor C oder D in der Erbmasse enthält, können also 100% Kranke, ebenso aber auch 25% Kranke, 50% Gefunde und 25% Typen hervorgehen. Phänotypisch Gefunde führen also keinen oder nur einen der genannten Faktoren in ihrer Erbmasse. Kranke treten nur auf, wenn ein C-Träger einen D-Träger heiratet. Da die meisten Menschen keinen Faktor tragen, kann sich ein Mensch mit nur einem solchen in einer gefunden Sippe ungeschadet fortpflanzen. Erst eine zufällige Kombination CD bringt Kranke. Dies nehmen Verfasser zur Erklärung der — nach ihrer Meinung scheinbaren — manchmal zu beobachtenden Rezessivität. Als letzten Grund der Erkrankung halten auch sie eine Mutation für nicht ausgeschlossen, doch sei sie äußerst

felten, da, wie erwähnt, ein Typ, — um einen solchen handle es sich bei der Mutation — sich lange fortpflanzen und verbreiten kann, ehe durch zufällige Kombination C D das Leiden offenbar wird. Verfasser finden diese Theorie auf ihren eigenen Stammbaum anwendbar. Um aber allgemein gültig zu sein, müsse dies auch bei den in der Literatur niedergelegten Stammbäumen der Fall sein, wenigstens dürfe sie nicht im Gegensatz zu diesen stehen. Diese Forderung betrachten *Diehl, Hansen, v. Ubisch* als erfüllt. Die „isolierten“ Fälle berücksichtigen sie bei der Festlegung des Erbganges der Muskeldystrophie — das sei nochmals betont — garnicht.

Eine Fortführung des von diesen beschriebenen Stammbaums bringt *Dittrich* (1932). Er fügt noch einige inzwischen erkrankte Personen in das Schema ein, die aber den Aspekt des Stammbaumes nicht ändern. Die von *Diehl u. a.* beschriebenen Typen will auch er beobachtet haben.

Eigene Untersuchungen stellt *Dittrich* an 19 Stammbäumen an bei 16 isolierten Fällen. Ein Stammbaum mit 6 erkrankten männlichen Personen wird genauer beschrieben. Der Erbgang zeigt nach *Dittrich* einen geschlechtsgebundenen rezessiven Modus. Die Krankheit wurde von den gesunden Müttern auf die Söhne übertragen und zwar sollen vorwiegend die ältesten Schwestern Konduktorinnen sein. Von sonstigen Erb-leiden ist die Familie verschont. Als aetiologisch wichtig für das Auftreten der Muskeldystrophie wurde von der Familie die Bleivergiftung eines Vorfahren angesehen, eine Ansicht, der der Verfasser sich nicht glaubt anschließen zu können. Pseudohypertrophie tritt nach seiner Ansicht familiär auf.

Verfasser gibt für seinen eigenen Stammbaum geschlechtsgebundene Rezessivität an. Die Verschiedenheit der in der Literatur beschriebenen Erbgänge erklärt er sich mit der von *Fischer* definierten „komplexen Vererbung“. Er zitiert hier *Dürken*: „Der gleiche Ausfall tritt auf, mag von dem Komplex z. B. „Muskulatur“ etwa Gen 2 oder Gen 4 erkrankt sein. Zwar tritt die gleiche Krankheit auf, aber verschiedener Erbgang.“

Minkowski und *Sidler* haben in einem vom Verkehr abgeschlossenen Gebirgstal der Schweiz eine Dystrophiker-Sippe außerordentlich eingehend untersucht. Sie erfassen in ihrem Stammbaum 13 Kranke, die alle aus Verwandtschaftsehen stammen und auch selbst

blutsverwandt sind. In keinem Falle hatten Kranke auch kranke Eltern oder Kranke in der direkten Ascendenz. In drei Fällen trat das Leiden bei 2 Kindern einer Familie auf. Aus diesen Tatsachen ziehen die Verfasser den Schluß, daß die Muskeldystrophie hier einem rezessiven Erbmodus folgt. Verfasser fanden, daß die Eltern der Kranken immer auf zwei verschiedene Stämme zurückzuführen sind, daß also mit anderen Worten die Krankheit dann entsteht, wenn Nachkommen aus zwei bestimmten Familien sich kreuzen. Dies führt sie zu der Annahme, daß hier ein doppeltrezessiver Erbgang vorliegen könnte. Im gewissen Sinne hätte dann dieser Modus eine Ähnlichkeit mit der Lehre von *Diehl, Hansen, v. Ubisch*, die ja auch die Entstehung der Muskeldystrophie auf die Kombination zweier verschiedener Faktoren zurückzuführen versuchen. Ein Analogon zu dem von diesen gesehenen „Typ“, der wohl einem Heterozygoten entspricht, haben *Minkowski* und *Sidler* nicht gesehen.

Diese vier Arbeiten aus dem vorliegenden Schrifttum zeigen bereits, daß fast alle bekannten Erbgänge bei der Muskeldystrophie beschrieben wurden. *Weitz* tritt für einen dominanten Erbgang bei häufigen Mutationen, *Diehl, Hansen, v. Ubisch* für dimere Dominanz ein. Im Gegensatz hierzu sah *Dittrich* den geschlechtsgebundenen rezessiven Erbgang, während *Minkowski-Sidler* sich für einen rezessiven aussprechen. Es bleibt nun übrig festzustellen, wieweit den einzelnen Lehren eine richtige Deutung der vorhandenen Stammbäume zugrunde liegt, und — unter der Annahme, daß die Erbgänge der Muskeldystrophie verschieden sein können — welchem Erbgange sie gegebenenfalls am häufigsten folgt. Dies klarzustellen erscheint schon im Hinblick auf die heutige Erbgesetzgebung äußerst bedeutsam.

Weitz führt das Entstehen der Muskeldystrophie auf gehäufte Mutationen zurück. *Diehl, Hansen, v. Ubisch* führen dagegen an, daß sich beim Studium der Pflanzen- und Tiervererbungen hierfür kein Analogon finden lasse. Der gleichen Ansicht ist *Lenz*, der die Arbeiten vor allem von *Muller* aus der Morganischen Schule erwähnt. *Muller* fand bei *Drosophila* bei ungestörter Zucht einige Prozent Mutationen. *Lenz* nimmt auf Grund seiner Erfahrungen und aus diesen Tierexperimenten schließend, für den Menschen eine Häufigkeit

von ca. 1% an. Da man beim Menschen mit einigen Tausend Genen rechnet, mutiert somit ein bestimmtes Gen in einer Häufigkeit von etwa eins zu mehreren Hunderttausend. Demnach ist die Möglichkeit, daß ein bestimmtes Gen in eine bestimmte Richtung mutiert auf vielleicht eins zu vielen Millionen anzunehmen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch *Baur*. Diese tierexperimentell belegten Zahlen zeigen, daß sich eine solche Häufigkeit von Mutationen, wie sie von *Weitz* angegeben wurde, nicht vertreten läßt.

Bei den durch Röntgenstrahlen erzwungenen Mutationen fand man ein Weitergeben vorwiegend im rezessiven oder geschlechtsgebunden rezessiven Erbgang. Ferner widerspricht den dominant vererbenden Mutationen, die im Augenblick des Entstehens offenbar werden, die relative Häufigkeit der familiären Fälle unter den sporadischen. *Weitz* gibt für sein eigenes Material über 20% an, wo zwei oder mehr Geschwister plötzlich erkrankten. Diese Beobachtung spricht eher für vorliegende Rezessivität.

Für Dominanz tritt neben *Weitz* vor allem *Dawidenkow*, zumindest bei verschiedenen Formen der Muskeldystrophie ein — einfache Dominanz will er allerdings nur bei einem kleinen Teil seiner Beobachtungen gesehen haben. Der größere Teil zeige eine Dominanz, die durch das männliche Geschlecht teilweise begrenzt sei. Dies entspricht also gewissermaßen den „Verhinderungsfaktoren“, die *Weitz* für das weibliche Geschlecht annimmt. Diese geschlechtskontrollierte Vererbung halten *Diehl*, *Hansen*, v. *Ubißch* (i. o.) zwar für theoretisch möglich, stimmen ihr aber nicht zu. Die Konstitution des Frauenkörpers, die Korrelation der Hormone usw. könnten an sich das phänotypische Offenbarwerden einer genotypisch vorhandenen Krankheitsanlage verhindern, doch sei nicht einzusehen, daß eine Frau über solche Faktoren verfügen soll, ihre Schwester und andere weibliche Verwandten dagegen nicht. (Wie oben erwähnt, verzichteten sie ganz auf eine Erklärung des Überwiegens männlicher Kranken, da dies ihrer Ansicht nach garnicht vorliegt.) Einen rezessiven oder geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang lehnt *Dawidenkow* mit *Krychowa* (1930) solange ab, bis eindeutige Stammbäume hierfür vorlägen. Auch er habe angeblich gesunde Konduktorinnen beobach-

tet, die die Krankheit auf ihre Söhne übertrugen, doch glaubt er nicht an die Gesundheit dieser Frauen, sondern fahndet nach latenten Krankheitszeichen. Er findet bei diesen Untersuchungen an den Müttern kranker Knaben Anomalien am Muskel- und Knochensystem, die er für verwandt mit der Muskeldystrophie hält oder sogar als abortive Form anspricht. Ob dies in allen von ihm beschriebenen Fällen zutrifft, bleibt dahingestellt. Doch hat man zweifellos den Eindruck, als sei die Annahme eines Zusammenhangs der gefundenen Veränderungen mit der Muskeldystrophie zu weitgehend. *Weitz* führt zu den Untersuchungen gesunder Mütter von Erbkranken folgendes aus: „Besondere Zeichen der Degeneration wurden bei den Eltern der Erkrankten . . . nicht gesehen.“

Offenbare Dominanz zeigt weiter der von *Kehrer* veröffentlichte Stammbaum (von *El. Grothaus* weitergeführt), in dem mehrere Generationen hindurch Kranke auch kranke Eltern hatten. Das Gleiche gilt von den Arbeiten *Rieses* und *Barsikows*. Die von *Pamboukis* aufgezeichnete Sippe zeigt ebenfalls dominantes Gepräge. Dieser Stammbaum umfaßt Kranke, die vornehmlich an ganz leichten Formen (formes frustres) der Muskeldystrophie erkrankt sind. Es ist ja durch die Eigenart des dominanten Erbganges bedingt, daß die Erblichen, die ihm folgen, im höheren Alter oder nur in leichter Art auftreten, da sonst eine direkte Übertragung in Frage gestellt ist. *H. Hoffmann* und *O. Claus* bringen einen Stammbaum, der acht sicher erkrankte Personen umfaßt. Während die späteren Generationen dominante Vererbung zeigen, scheint ein Vorelternpaar gesund gewesen zu sein, doch sind wohl genaue Erhebungen hierüber nicht mehr zu erhalten gewesen. Der Stammbaum zeigt im wesentlichen dominantes Gepräge. In den Sippen, in denen die Muskeldystrophie dominantem Erbgang folgt, sind bei den Kranken hauptsächlich die Muskeln des Schultergürtels, der Oberarme und des Gesichtes befallen (s. a. *Lenz*, *Dawidenkow*, *Minkowski-Sidler*). Das Leiden verläuft meist leicht und beginnt nicht vor dem 3. Decennium, sodaß es einem dominanten Erbgang folgen kann. In diesen Sippen werden in der Regel gleichviel kranke Männer und Frauen gezählt (*Lenz*).

Einen „dominanten Aspekt“ hat auch die Sippe von *Diehl, Hansen, v. Ubisch*, für die die Verfasser den Erbgang der dimeren Dominanz ermittelten. Verfasser halten diese Lehre auch auf die übrigen Stammbäume des Schrifttums für anwendbar, wenigstens zeige sich kein Gegensatz. Dies trifft aber bei vielen erforschten Sippen nicht zu. Zwar nehmen *Minkowski-Sidler* einen doppelt rezessiven Erbgang an, also gewissermaßen auch zwei verschiedene Faktoren, deren Zusammentreffen die Krankheit auslösen soll, doch zeigt ihr Stammbaum rezessives Gepräge. Ein Analogon zu dem von *Diehl, Hansen, v. Ubisch* beschriebenen „Typ“, „der wohl dem klinischen Korrelat eines Heterogameten entspricht“, hätten sie nicht gefunden (f. o.).

Als Prototyp eines Stammbaumes, der im deutlichen Gegensatz zu der Lehre der dimeren Dominanz steht, sei hier der Stammbaum von *Kostakow* angeführt, welcher einen ausgesprochen geschlechtsgebunden rezessiven Erbgang zeigt. In dieser Sippe stammen die Kranken aus 11 Ehen gesunder Eltern. Die Frauen sind alle untereinander verwandt und haben selbst kranke Brüder. Die Männer sind nicht verwandt und weisen in ihrer Familie weder Muskeldystrophie noch den von *Diehl-Hansen* beschriebenen „Typ“ auf. Nimmt man nun an, daß die phänotypisch gefunden Frauen alle in ihrer Erbmasse einen der beiden Faktoren C oder D enthielten, so ist doch ganz unwahrscheinlich, daß alle Männer den entsprechenden anderen Erbfaktor führten. Ist aber einer dieser Faktoren so außerordentlich häufig, so ist die Annahme eines dimeren Erbganges unnötig, da dann eben nur der seltene Faktor eigentlich die Krankheit auslöst. Somit ist es unmöglich, den von *Kostakow* angegebenen Stammbaum mit dimerer Dominanz zu erklären. Ähnliche Stammbäume sind so häufig gesehen worden, daß der von *Diehl-Hansen* gefundene Erbmodus nicht allgemein gültig sein kann. So sah auch *Dittrich* in dem von ihm beschriebenen Stammbaum rezessivgeschlechtsgebundenen Erbgang. Bei diesem Modus wird das Leiden von der phänotypisch gefunden Frau, deren Mann gesund sein kann, auf die Hälfte der Söhne übertragen, während die Hälfte der Töchter wieder Konduktorinnen sind.

Wie schon oben erwähnt, traf auch *Weitz* diesen Erbgang in verschiedenen Sippen an. Diesen Modus zeigen z. B. seine Beobachtungen I, IV und XII. In der Literatur finden sich schon Hinweise in dieser Richtung bei *Davidson-Moebius*, *Erb*, *Däufer*, *Sacaze* und *Brauser*.

Über seine Beobachtungen äußert *Weitz*: „Gewöhnlich sind aber die Eltern der Erkrankten gesund“. An anderer Stelle: „Das andere mal scheint es so, als ob die gesunde Mutter allein Trägerin der Vererbung sei“. Somit erkennt *Weitz* an, daß die Muskeldystrophie manchmal dem geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang zu folgen scheint. Er will jedoch diesen Modus nicht für allgemeingültig gelten lassen, weil er zu selten beobachtet sei und auch zu oft durchbrochen würde.

Andere Forscher räumten schon damals diesem Modus eine größere Bedeutung ein. So sagt *Bing*: „Neben dem durch typisch heredofamiliäres Auftreten imponierenden Fällen, wobei die Übertragung hauptsächlich durch die Mütter geschieht, die aber selbst von der Krankheit verschont bleiben können — ich bezeichne letzteres als die „materne metraphektische“ Vererbung — kommen auch sporadische Fälle vor . . .“ (Auf die „sporadischen“ Fälle soll weiter unten noch näher eingegangen werden.)

Gowers nimmt an, daß bei der pseudohypertrophischen Form ausnahmslos mütterliche Übertragung stattfindet; sie sei überhaupt für frühzeitig einsetzende heredofamiliäre Leiden typisch, während bei Leiden, deren Beginn im höheren Alter liege, paternale und maternale Übertragung gleich häufig zu finden sei.

Inzwischen sind so viele eindeutige Sippen, in denen die progressive Muskeldystrophie dem rezessiv geschlechtsgebundenen Erbmodus folgt, durchforscht und bekanntgegeben worden, daß dieser Erbgang als wichtig und häufig angesehen werden muß. So veröffentlichte *Grünberg* einen Stammbaum, in dem 6 männliche Kranke aufgeführt sind. Die Eltern der letzten Generation — 4 kranke Söhne und phänotypisch gesunde Töchter — sind selbst gesund. Die Mutter hat aber 2 Brüder, die an Muskeldystrophie leiden. Der Vater hat in einer zweiten Ehe mit einer gesunden Frau 2 gesunde Söhne und eine

gesunde Tochter. Dies bestätigt die Annahme, daß in diesem Falle die phänotypisch gesunde Frau — aber eine Schwester erkrankter Knaben — die alleinige Überträgerin des Leidens war. Somit liegt hier ein typisch geschlechtsgebunden-rezessiver Erbgang vor.

Das Gleiche gilt von einem Stammbaum, den *Krychowa* und *Abowjan* 1934 veröffentlichten. Der Krankheitstyp ist die Duchenne'sche Pseudohypertrophie. „In den 4 Generationen, wo das Leiden auftritt, erkrankten männliche Individuen im Verhältnis 7 : 6 zu den Gesunden; die Übertragung findet durch die Mutter statt und übertragen 3 mal heterozygote Frauen die Erkrankung ihren Söhnen.“ Verfasser stellen fest, daß auf die Möglichkeit des rezessiven-geschlechtsgebundenen Erbganges für die progressive Muskeldystrophie außer *Weitz* auch *Lenz* und *Siemens* hinweisen. *Dawidenkow* betrachte die Duchenne'sche Pseudohypertrophie als eine besondere nosologische Gruppe mit dominantem Erbgang bei begrenztem Auftreten beim weiblichen Geschlecht. Ein geschlechtsgebunden-rezessiver Erbgang ist nach *Dawidenkow* jedoch erst dann anzuerkennen, wenn beweisende Stammbäume vorliegen.

Krychowa und *Abowjan* halten ihren Stammbaum für einen solchen beweisenden. Daß bei der Pseudohypertrophie *Duchenne* auch einmal erkrankte Frauen beobachtet sind, erscheint den Verfassern nicht als Gegenbeweis. Sie halten es für möglich, daß sich auch bei heterozygoten Frauen einmal die Erkrankung äußern könne analog der Leber'schen Sehnerventrophie nach *Just-Stachelin* oder dem von *Lenz* beschriebenen hereditären Nystagmus.

Eine Familie, in der außer der geschlechtsgebunden-rezessiv weitergegebenen Muskeldystrophie noch andere Erb leiden beobachtet werden, beschreiben *S. Smitt* und *W. Smit*. Eine gesunde Frau, von gesunden Eltern abstammend, deren Brüder aber an einer Muskeldystrophie oder an einer Kombination dieses Leidens mit Idiotie leiden, ist mit einem Manne verheiratet, in dessen Familie Augenleiden (Mikrophthalmie u. a.) beobachtet wurden. Von den 4 Knaben dieser Eltern leiden 3 an progressiver Muskeldystrophie kombiniert mit Mikrophthalmie. Der vierte Knabe ist gesund. Die Muskeldystrophie ist also von der mütterlichen Seite geschlechtsgebunden-rezessiv, die

Mikrophthalmie von der väterlichen Seite dominant vererbt. Es handelt sich hierbei somit lediglich um ein zufälliges Zusammentreffen der beiden Erbweisen, ein Kausalzusammenhang ist wohl abzulehnen.

Einen weiteren Beitrag zu der Frage dieses Erbganges bietet die Arbeit von *Valentin-Mestern*. *Valentin* hebt hervor, daß er die gleichen Beobachtungen wie *Kostakow* gemacht habe, daß also auch sein Stammbaum reinen geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang zeigt.

In dieser Sippe besitzen niemals Kranke auch kranke Eltern. Stets stammt aber die Mutter aus einer Familie, deren kranke männliche Personen sie als Konduktorin kennzeichnen. Das Zahlenverhältnis ist folgendes: Aus Ehen von Konduktorinnen mit gesunden Männern gingen 15 Kinder hervor. Von 6 Knaben sind 4 erkrankt, von 8 weiblichen Personen 3 als Konduktorinnen entlarvt. Diese Zahlen entsprechen somit unter Berücksichtigung des Fehlers der kleinen Zahl gut den Zahlenverhältnissen, die man theoretisch bei geschlechtsgebunden-rezessivem Erbgang erwarten darf.

Kurze Angaben über ein familiäres Auftreten der Muskeldystrophie, das auch hier einzureihen sein dürfte, machten *E. Scolari* und *G. Dell'Aqua*. Die Andeutungen sind aber für erbbiologische Zwecke zu dürftig. *Scolari* schildert die Familien dreier Schwestern, die selbst gesund und mit gesunden Männern verheiratet sind. Alle drei haben unter ihren Nachkommen Knaben, die an progressiver Muskeldystrophie erkrankt sind. Leider fehlen Angaben über die Verhältnisse bei den weiteren Geschwistern und in der Ascendenz. *Dell'Aqua* findet in einer Familie drei erkrankte Knaben mit Duchenne'scher Pseudohypertrophie mit Homochronie und weitgehender Homologie.

Der größte und eindeutigste veröffentlichte Stammbaum, der dem geschlechtsgebunden-rezessiven Erbmodus folgt, ist der Stammbaum von *Kostakow*. In der geschilderten Sippe treten in 3 Generationen 15 kranke männliche Personen auf, die aus 11 Ehen gesunder Eltern stammen. Die Frauen gehören alle der gleichen Sippe an, die Männer sind nicht mit ihnen oder untereinander verwandt. In den Familien mit Kranken sind 50 bis 100% der männlichen Nachkommen erkrankt. Von den 26 weiblichen Geschwistern sind 10 durch ihre kranken Söhne als Konduktorinnen festgestellt. Der Stammbaum

umfaßt 3 ausführlich erforſchte Generationen. Eine Homologie und gewiſſe Homochronie der Erkrankungsfälle ſcheint gewahrt zu ſein. Auch hier ſpricht alſo das Zahlenverhältnis und die eindeutige Übertragung des Leidens durch die geſunde Mutter auf einen Teil der Knaben für geſchlechtsgebundene Rezefſivität.

Es folgen zwei Stammbäume, die als weitere Beiſpiele eines geſchlechtsgebunden-rezefſiven Erbgangs gelten mögen.

Die Befunde zum Stammbaum D wurden, ſoweit ſie nicht perſönlich erhoben wurden, von einem Arzte angegeben, der dem Auftreten der Muskeldystrophie in dieſer Familie beſonders nachgegangen iſt.

Es ſeien im folgenden die Daten der einzelnen Perſonen des Stammbaumes D kurz aufgeführt.

Die Stammtafeln dieſes und der folgenden Stammbäume ſind in der Arbeit von *Koſtakow-Bodarwe* im „Deutſchen Archiv f. klin. Med.“ 1938. abgebildet.

Nr. 1. Cl. Geb. 1848, ſtarb im Alter von 81 Jahren. War geſund.

Nr. 2 Frau Cl. geb. J., geb. 1850, ſtarb im Alter von 45 Jahren. Todesurſache?

Nr. 3. Nach Amerika ausgewandert. Er wie auch ſeine Nachkommen ſind nach Angaben der Familie geſund.

Nr. 4. Iſt geſund. Ebenſo ſeine beiden Kinder.

Nr. 5. Geſund.

Nr. 6. Starb im Alter von etwa 14 Jahren an Tuberculose. Er litt an der infantilen Form der progrefſiven Muskeldystrophie mit Pſeudohypertrophie vor allem der Wadenmuskulatur. Hauptſächlich waren befallen: Muskeln des Beckengürtels, die langen Rückenmuskeln, die Beinmuskeln und im geringen Grade auch die Muskulatur des Schultergürtels.

Nr. 7. Ebenfalls im Alter von 14—15 Jahren geſtorben. Die eigentliche Todesurſache war wie bei ſeinem Bruder Nr. 6 „Lungenleiden“. Sein Krankheitsbild zeigte das gleiche wie bei Nr. 6: primärer Befall der Rücken- und Beckenringmuskulatur. Pſeudohypertrophie der Waden.

Nr. 8 u. 9. Beide waren an der gleichen Form der Muskeldystrophie erkrankt wie ihre Brüder Nr. 6 u. 7: Beginn der Erkrankung im Kleinkindesalter, Hauptſitz der Erkrankung: Beckengürtel, Rücken, Arme relativ frei. Beide ſtarben auch etwa im gleichen Alter mit

- ca. 14—16 Jahren. Die eigentliche Todesursache war bei den letzten beiden Knaben nicht festgestellt. Sie wurden eines Morgens tot im Bett gefunden.
- Nr. 10. Frau D. geb. Cl. lebt noch und ist gesund. Sie läßt ihre genotypische Anlage zur Muskeldystrophie, die ihre erkrankten Brüder und ihr Sohn beweisen, phänotypisch nicht erkennen.
- Nr. 11. Gesund, kein Anhalt für Muskeldystrophie.
- Nr. 12. Gesund.
- Nr. 13. Gesund, mit gesunder Frau verheiratet, 2 Kinder sind ebenfalls gesund.
- Nr. 14. Selbst gesund, mit gesundem Mann verheiratet. Ihr erkrankter Sohn beweist aber ihre genotypische Krankheitsanlage.
- Nr. 15. Gesund, keine Kinder.
- Nr. 16. Gesund, verheiratet, 2 gesunde Kinder.
- Nr. 17 u. 18. Bei beiden ist kein Befund, der für Muskeldystrophie spräche, zu erheben.
- Nr. 19. Frau D. geb. D. Gesund. Läßt ihrem Äußeren nach nicht auf ihre Krankheitsanlage schließen, die ihr kranker Bruder und ihre kranken Söhne beweisen.
- Nr. 20. Litt an progressiver Muskeldystrophie. Befallene Muskelgruppen: Beinmuskeln (Pseudohypertrophie der Waden), Beckenmuskeln, lange Rückenstrecker. Weniger war der Schulterring befallen. Ein Aufrichten aus horizontaler Lage und Gehen unmöglich. Auch dieser Knabe starb mit ca. 15 Jahren an Lungentuberkulose.
- Nr. 21. Fühlt sich gesund. Die ärztliche Untersuchung ergab einen essentiellen Hochdruck ohne pathologischen Befund an Herz und Nieren. Ein Anhalt für eine vielleicht larvierte Form der Muskeldystrophie wurde nicht gefunden.
- Nr. 22. Gesund.
- Nr. 23 u. 24. Töchter von Nr. 13. Stehen im Alter von ca. 18—22 Jahren, gesund.
- Nr. 25. Leidet an Muskeldystrophie. Sein Krankheitsbild weist weitgehende Homologie zu den beschriebenen Knaben und zu Nr. 29 auf.
- Nr. 26. Gesund.
- Nr. 27 u. 28. Zwei gesunde Knaben etwa im Pubertätsalter.
- Nr. 29. G.D. 12 Jahre alt. Leidet an progressiver Muskeldystrophie. Es fiel den Eltern zuerst auf, daß der Knabe, etwa im Alter von 3 Jahren, nicht mehr gut gehen und aufstehen konnte. Als er ins schulpflichtige Alter kam, konnte er wenigstens anfangs noch ohne Hilfe zur Schule gehen. Bald verschlimmerte sich sein Zustand aber so weit, daß er nicht mehr gehen und aufstehen konnte. Heute ist

faßt jede Lageveränderung des Rumpfes und der unteren Extremitäten unmöglich. Armheben bis zur Horizontalen möglich. Die Oberarme sind atrophisch, die Waden zeigen Pseudohypertrophie; während früher die Konsistenz der Wadenmuskulatur fest war, ist sie jetzt weich. Im Ganzen ist der Knabe sehr adipös. Das Gesicht zeigte eine gewisse mimische Starre. Die äußeren Genitalien sind zu klein. Testes kaum palpabel, höchstens erbsengroß. Der Junge ist manchmal auffallend erregt, weint und ist sehr unruhig. Der Knabe litt vor kurzem an einer schweren Pneumonie, die er aber gut überstand. Wa.R. neg.

- Nr. 30. H.D. ist heute 5 Jahre alt. Seit seinem 2. Lebensjahr fiel auf, daß er sich nicht allein erheben konnte. Treppensteigen ist ihm immer unmöglich gewesen. Er zeigt heute eine deutliche Pseudohypertrophie der Wadenmuskeln und eine leichte Lordose der Lendenwirbelsäule. Auf den Boden gelegte Gegenstände kann er zwar aufheben, „klettert“ aber beim Aufstehen mit den Armen an seinen Beinen in die Höhe. Sonst bietet der Knabe körperlich und psychisch das normale Bild seines Alters, während sein 12 Jahre alter Bruder weit hinter seinem Alter zurückgeblieben. Wa.R. neg.

Der vorliegende Stammbaum D umfaßt 30 Namen. Von diesen 30 Personen erkrankten 8 an progressiver Muskeldystrophie. Die Diagnose wurde an den beiden Knaben Nr. 29 und 30, deren Vater Arzt ist, durch eingehende Untersuchung erhärtet. (Professor *Thomas*.) Alle Erkrankten waren Knaben. Die Eltern waren in allen 4 Fällen gesund. Die Übertragung fand durch die gesunde Mutter statt, die in 3 Fällen durch kranke Brüder als Konduktorin offenbär wurde. Es handelt sich somit um geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang. Dem entsprechen auch die Zahlenverhältnisse unter Berücksichtigung des Fehlers der kleinen Zahl, der in den kinderarmen Ehen der beiden letzten Generationen besonders groß ist.

Unter diesen Einschränkungen wäre anzugeben, daß von den Knaben 50—100% erkrankt sind; von den 12 Frauen, die im Stammbaum aufgeführt sind, sind 6 verheiratet, von denen sich 3 als Konduktorinnen erwiesen.

Bei der Krankheit der Knaben handelt es sich um die infantile Form (*Duchenne, Landouzy-Déjerine*) der progressiven Muskeldystrophie mit Bevorzugung der Beckenmuskulatur. Neben dieser eindeutigen Homologie ist auch eine gewisse Homochromie zu beobach-

ten. Von den 8 Kranken starben 3 an einer Lungentuberculose, bei den 2 anderen Gestorbenen Nr. 8 und Nr. 9 ist auch eine Lungenerkrankung naheliegend. Der Knabe Nr. 29 litt, wie schon angeführt, kürzlich an einer schweren Pneumonie, von der er sich aber wieder gut erholte. In diesem Stammbaum kommt also auch die oft beschriebene Anfälligkeit der Muskeldystrophiker für Lungenerkrankungen zur Beobachtung. Der Hypogenitalismus des Knaben Nr. 29 ist ja häufig gerade bei der infantilen Duchenne'schen Form gesehen worden. (Hypergenitalismus bei der Duchenne'schen Pseudohypertrophie ist in seltenen Fällen auch beobachtet worden, z. B. bei einem von *J. Bauer* beschriebenen Knaben. Hier lag wohl eine innersekretorische Störung vor, die in keinem Zusammenhang mit der progressiven Muskeldystrophie steht.) Die Erregungszustände, unter denen der Knabe Nr. 29 leidet, sind ebenfalls auch anderswo zur Beobachtung gelangt. (*Krychowa und Abowjan u. a.*).

Der zweite geschlechtsgebunden-rezessive Stammbaum bietet kein so eindeutiges Bild wie der Stammbaum D, doch ist auch hier wohl nicht an der geschlechtsgebunden-rezessiven Bedingtheit des Leidens zu zweifeln.

Die Daten der Personen des Stammbaumes K.:

- Nr. 1. P. Alter und Todesursache unbekannt. Soll niemals schwer erkrankt gewesen sein.
- Nr. 2. F. P. Alter unbekannt. Über eigene Erkrankungen und über ihre Geschwister war nichts mehr zu ermitteln.
- Nr. 3. M. K. geb. R. War stets gesund. Starb im Alter von 86 Jahren an unbekannter Todesursache. Keine Nachkommen.
- Nr. 4. A. K. geb. R. War nie ernstlich krank. Steht heute im Alter von 86 Jahren, für ihr Alter relativ rüstig. 1 Sohn (†).
- Nr. 5. P. R. Lebt im hohen Alter. Gesund. 4 gesunde Kinder.
- Nr. 6. J. R. Gesund. 5 gesunde Kinder.
- Nr. 7. M. W. R. Starb im Alter von 60 Jahren im Anschluß an eine Operation „einer offenen Wunde am Kopf“. Vorher gesund.
- Nr. 8. K. R. geb. P. Starb im Alter von 82 Jahren am „Schlaganfall“. Vorher nach Familienangaben nie ernstlich krank gewesen.
- Nr. 9. W. P. Im Alter von 76 Jahren an Schlaganfall gestorben. Vorher nie ernstlich krank gewesen. Vor allem besteht kein Anhalt für Annahme einer — ev. larvierten Form — Muskeldystrophie.

- Nr. 10. J. P. Im Alter von 25 Jahren an unbekannter Todesursache gestorben. Leider war über seine Krankheiten und ob er evtl. an progressiver Muskeldystrophie gelitten habe, was ja nach dem Aspekt des Stammbaums naheliegt, nichts Bestimmtes mehr zu erfragen. Kirchen- und Standesamtsregister gaben keine Auskunft über Todesursachen.
- Nr. 11. M. K. Im Weltkrieg gefallen. War vorher stets gesund.
- Nr. 12. W. R. Nr. 13. J. R. Nr. 14. L. R. Nr. 15. K. R. Kinder von Nr. 5. Alle gesund.
- Nr. 16. M. R. Nr. 17. P. R. Nr. 18. H. R. Nr. 19. J. R. Nr. 20. H. R. Kinder von Nr. 6. Alle gesund.
- Nr. 21. H. R. geb. 1883. Lebt und ist gesund. Kein Anhalt für Muskeldystrophie. 3 Kinder.
- Nr. 22. J. R. litt an dystrophia muscul. progressiva. Nach den Schilderungen der Geschwister handelt es sich um Duchenne'sche Pseudohypertrophie: Die Krankheit begann im Kleinkinderalter und machte sich zuerst durch Gehstörungen bemerkbar. Anfangs wackelnder Gang. Später sei Gehen und Aufstehen aus horizontaler Lage überhaupt unmöglich gewesen. Der Knabe sei sehr dick gewesen, vor allem an Waden, Oberschenkeln und Bauch. Hohles Kreuz. Die Arme habe der Knabe noch gebrauchen können, doch seien sie auch verhältnismäßig kraftlos gewesen. Er starb im Alter von ca. 18 Jahren an Lungenentzündung.
- Nr. 23. Als Kleinkind verunglückt.
- Nr. 24. Starb als Kleinkind. Todesursache: „Krämpfe, Gehirnerschütterung“.
- Nr. 25. Als Kind gestorben. Ursache?
- Nr. 26. J. R. geb. 1892. Mit Ausnahme von Kinderkrankheiten stets gesund gewesen. Keine Funktionsstörungen der Muskulatur zu finden. 4 gesunde Kinder.
- Nr. 27. Frau K. geb. R. Ca. 40 Jahre alt. Niemals ernstlich krank gewesen. Zeigt kein Zeichen einer Muskeldystrophie. Erkrankte unter der Geburt ihres 3. Kindes (Muskeldystrophiker Nr. 43) an Eklampsie (keine sehr schwere Form): 3 Kinder.
- Nr. 28. J. K. Gesund.
- Nr. 29. P. K. geb. 1888, 1914 im Weltkrieg gefallen. Gesund.
- Nr. 30. M. K. geb. 1893. Stets gesund gewesen.
- Nr. 31. F. K. geb. 1895. Gesund.
- Nr. 32. J. K. geb. 1896. Gesund.
- Nr. 33. A. K. geb. 1899. Immer gesund gewesen.
- Nr. 34. Nr. 35. Nr. 36. Kinder von Nr. 21. Alle gesund. Kein Anhalt für Muskeldystrophie.

- Nr. 37—40. Kinder von J. R. Nr. 20. Alter 3—15 Jahre. Alle gelund.
- Nr. 41. G. K. 15 Jahre alt. Gefundes kräftiges Mädchen. Außer an Kinderkrankheiten nie ernstlich erkrankt gewesen.
- Nr. 42. 13 Jahre alt. Gefund. Für sein Alter kräftig. Kein Zeichen einer Muskeldystrophie. Keine Muskeldefekte u. ä. nachweisbar.
- Nr. 43. A. K. Leidet an *dystrophia musculorum progressiva*. Seine Mutter erkrankte gegen Ende der Gravidität an mittelfchwerer Eklampsie. A. K. hatte hohes Geburtsgewicht und entwickelte sich als Säugling normal. Mit 1½ Jahren konnte er laufen. Den Eltern fiel auf, daß er mühsam und eigentümlich watschelnd ging. Treppensteigen war unmöglich. Ebenso vermochte der Knabe sich nicht aus liegender Stellung aufzusetzen oder am Boden liegende Gegenstände aufzuheben, ohne sich aufzustützen. Eine Untersuchung in der Ambulanz der mediz. Klinik stellte die Diagnose: Muskeldystrophie. Heute im Alter von 9 Jahren bietet der Knabe folgendes Bild: Gehen ohne fremde Unterstützung ist gänzlich unmöglich. Gebrauch der Arme fast normal möglich, nur können sie nicht viel über horizontal gehoben werden. Ausgesprochene Pseudohypertrophie der Waden. Hängebauch, starke Lordose vor allem der Lendenwirbelsäule. In letzter Zeit macht sich ein starker Fettanatz bemerkbar. Psychisch erreicht das Kind den normalen Altersstand.

Der Stammbaum K. umfaßt 43 Namen. 13 Personen sind tot. 10 Personen konnten persönlich besucht werden. Die Diagnose „Muskeldystrophie“ bei dem noch lebenden Kranken wurde durch klinische Untersuchung in der mediz. Klinik Bonn erhärtet.

In zwei Familien tritt je ein kranker Knabe auf. Die gesunde Mutter des letzterkrankten Knaben hat die Krankheit übertragen, da sie durch ihren kranken Bruder als Konduktorin erkennbar ist. In der Familie ihres Gatten und ihres Vaters ist keine Anlage für Muskeldystrophie erkennbar, auch in diesem Falle ist somit geschlechtsgebunden-rezessiver Erbgang anzunehmen. Die Form der Muskeldystrophie ist in beiden Fällen die Duchenne'sche Pseudohypertrophie. Nach den Schilderungen der Familie über den schon verstorbenen Kranken ist weitgehende Homologie anzunehmen. Ob Homochromie vorliegt, ist nicht mehr genau zu eruieren, ist aber nach den Angaben wahrscheinlich.

Typisch ist auch hier, daß der eine kranke Knabe an einer Lun-

genaffektion starb, was gerade bei der infantilen Form der Muskeldystrophie so häufig beobachtet worden ist.

Auch *Lenz* hält geschlechtsgebundene Rezessivität als Erbform der Muskeldystrophie für möglich. Er führt aus: „Es sind allerdings einige wenige Sippen bekannt geworden, die sich nur recht gezwungen mit diesem Erbgang vereinigen lassen (*Lenz* meint die von *Weitz* und *Dawidenkow* vertretene geschlechtskontrollierte Dominanz), die vielmehr das typische Bild des rezessiven geschlechtsgebundenen Erbganges zeigen, so insbesondere eine von *Kostakow* angegebene Sippentafel.“ Allerdings spricht nach *Lenz* das gelegentlich beobachtete gleichzeitige Vorkommen des Leidens bei Vater und Sohn gegen geschlechtsgebundene Rezessivität. *Krychowa* und *Abowjan* halten diese seltene Beobachtung nicht für einen Gegenbeweis gegen geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang. Sie nehmen an, daß in den Fällen, wo Vater und Sohn krank waren, entweder die gesunde Mutter des kranken Sohnes heterozygot war, „oder daß es zu keiner Trennung „nondisjunction“ der XX Chromosomen bei der Mutter kam und der Sohn X O Typ hatte (X bekam er vom Vater).“

Heute rechnet man jedenfalls mit einem geschlechtsgebundenen Erbgang, bei dem die gesunde Mutter das Leiden auf ihre Söhne überträgt. So sagt *Strube*: „Vom eugenischen Standpunkt ist es wesentlich, daß in den meisten Familien mit Muskeldystrophie die Krankheit die Männer befällt und durch die gefunden weiblichen Mitglieder vererbt wird.“ *Curschmann* bemerkt unter Bezugnahme auf die von *Kostakow* publizierte Sippe: „In eugenischer Beziehung scheint es also am gefährlichsten, wenn eine scheinbar gesunde Frau aus einer Muskeldystrophikerfamilie Kinder zeugt, von denen mindestens die Knaben in fast 100% (*Weitz* 50%) die Krankheit erben. Die Heirat eines gefunden Mannes scheint nahezu unbedenklich.“

„Dagegen sollte der eugenische Eheberater sich umso mehr nach diesen Ergebnissen richten; vor allem bezüglich der dringenden Warnung vor den gefunden Konduktorinnen.“

Die Heirat eines gefunden Mannes aus einer Muskeldystrophie-

kerfamilie hält auch v. *Verfchuer* für in eugenischer Hinsicht ungefährlich; einem in bezug auf die Muskulatur gefunden Manne (Nr. 21 im Stammbaum D), dessen Bruder Muskeldystrophiker und dessen Schwester Konduktorin ist, glaubt er die Eheauglichkeit nicht abprechen zu können. Ein kranker Mann aus einer solchen Sippe stellt in eugenischer Beziehung keine so große Belastung dar, da er wegen des frühen Beginns und der Schwere des Leidens meist nicht zur Fortpflanzung kommt (*Kostakow*).

Im Gegensatz hierzu bezeichnete *Dawidenkow* die bei genauer Untersuchung als ganz gesund gefundene Frau aus einer Muskeldystrophiker-Sippe als in eugenischer Beziehung für nahezu ungefährlich, da er ja einen dominanten Erbgang annimmt. Diese Annahme wird heute allgemein abgelehnt, was alle angeführten Beispiele beweisen.

Der geschlechtsgebunden-rezessive Erbgang ist bei der Muskeldystrophie sicher und häufig zur Beobachtung gelangt. Wie weit er nur für bestimmte Unterformen der Muskeldystrophie, etwa für die Pseudohypertrophie Duchenne, wie in unseren Stammbäumen, gilt, ist erst zu übersehen, wenn in allen Stammbäumen in dieser Hinsicht eindeutige Angaben gemacht werden. Nach den bisherigen Beobachtungen scheint dies wahrscheinlich. Man muß hier *Gowers* recht geben, wenn er den geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang als typisch für frühzeitig einsetzende Erbkrankheiten bezeichnet. Die Krankheit muß eben in solchen Fällen gleichsam auf eine Dominanz verzichten, da die Befallenen für eine Fortpflanzung untauglich sind. Dies gilt dann auch für die frühzeitig einsetzenden Formen der progressiven Muskeldystrophie, also z. B. für die Pseudohypertrophie nach Duchenne.

Häufiger noch als dem geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang und überhaupt am häufigsten folgt die progressive Muskeldystrophie einem einfach rezessiven Erbgang. In dem Schrifttum über Vererbung der Muskeldystrophie sind Beobachtungen über solche rezessiven Erbmodi jedoch selten beschrieben.

Dies ist darin begründet, daß sich hierbei keine so eindeutigen Schemata ergeben wie bei der Dominanz und dem geschlechtsgebunden-rezessiven Modus. Diese beiden Formen lassen sich schon aus

einem Stammbaum eindeutig ermitteln. Zur Feststellung der Rezessivität eines Erbleidens bedarf es dagegen viel weitgehenderer und systematischerer Untersuchungen, wobei auch entfernte Seitenlinien Beachtung verdienen. Man hat meistens, wenn bei einem Patienten anamnestisch kein weiterer Krankheitsfall mehr eruierbar war, ihn einfach unter die „isolierten Fälle“ eingereiht, ohne den Kreis der Untersuchungen auf seine Sippe auszudehnen.

Gerade die große Zahl der „isolierten“ Fälle bei einer Erkrankung, die oft einen deutlichen Erbgang zeigt, sollte doch zu bedenken geben, ob nicht auch diese „isolierten Fälle“ aufgrund einer Erbanlage entstanden sind. Ein solches „isoliertes“ oder doch seltenes Auftreten einer Krankheit in einer Familie kann die Auswirkung eines rezessiven Erbganges sein. Zur Annahme einer Rezessivität bedarf es nicht der Feststellung einer Erkrankungshäufigkeit von 25 % unter den Nachkommen. Schon ein häufigeres Vorkommen von Verwandten in der Ascendenz, und ein häufigeres Auftreten der Erkrankung unter Geschwistern als bei Eltern und Kindern rechtfertigen die Annahme eines rezessiven Erbganges.

Wichtig wäre also, bei den „isolierten“ Muskeldystrophiefällen die Ascendenz systematisch auf Verwandten zu untersuchen. Die Zahl der Verwandten muß natürlich relativ umso größer sein, je seltener die betreffende Erbkrankheit auftritt. Da die Dystrophia musculorum progressiva ein relativ seltenes Erbleiden ist, müßte sich auch hier zum Beweis einer rezessiven Erbbedingtheit eine deutlich überdurchschnittliche Zahl von Verwandten feststellen lassen. In der Tat sind höhere Zahlen, als dem Durchschnitt entsprechen, bereits von Weitz gefunden worden: „Rechnen wir alle genannten Fälle mit, bei denen rezessiver Erbgang vorliegen könnte, so stammen die Erkrankten in 12 Familien aus 14 Ehen und darunter 3 Vetternen, das sind 21,4 %. Dieser Prozentsatz übersteigt den normalen sehr beträchtlich.“

In der gesamten Literatur fand Weitz einen Prozentsatz von 3 %. Nach Lenz beträgt der Prozentsatz der Verwandten unter der gesamten Bevölkerung rund $\frac{1}{2}$ bis höchstens 1 %, sodaß sich also ein deutliches Überwiegen der Verwandten in den Muskeldystro-

phikerfamilien ergibt. Vielleicht werden diese Zahlenverhältnisse noch eindeutiger, wenn man allen „isolierten“ Fällen in dieser Beziehung sorgfältiger nachgeht.

Ferner spricht für Rezessivität das gleichzeitige Auftreten der Muskeldystrophie bei zwei und mehreren Geschwistern. Nach *Weitz* kamen auf 54 Fälle, wo nur ein Kind erkrankte, 12 Fälle, wo mehrere von der Muskeldystrophie befallen wurden. Theoretisch kann man nach *Lenz* unter der Annahme, daß jede Familie im Durchschnitt 3 Kinder hat, auf 54 isolierte Fälle 20 ± 4 familiäre erwarten. Die von *Weitz* gefundenen Zahlen entsprechen somit, wieder unter Berücksichtigung des Fehlers der kleinen Zahl, den theoretischen Forderungen, stehen zumindest nicht im Gegensatz hierzu.

Wie zwanglos sich bei rezessivem Erbgang ein isoliertes Vorkommen eines Erbleidens in einer Sippe selbst bei Verwandtenehen deuten läßt, möge ein von *Lenz* konstruiertes Schema zeigen:




Abb. 1. Aus Bauer-Fischer-Lenz. (Auszug)

Hiernach scheint es angebracht, den Begriff „isolierter Fall“ bei der Muskeldystrophie nicht mehr anzuwenden, wenigstens, wenn er in dem Sinne verstanden wird, daß dieses plötzliche Auftreten der Muskeldystrophie nicht erbbedingt sei. Es ist vielmehr berechtigt, solche sporadischen Fälle als Auswirkungen eines rezessiven Erbganges aufzufassen.

Die von *Weitz* vertretene Ansicht, die sporadischen Fälle als soeben durch Mutation entstanden zu betrachten, ist, wie oben dargelegt, nicht zutreffend, da die so große Häufigkeit von Mutationen den erbbiologischen Erfahrungen widerspricht. Gewiß muß man,

auch wenn man rezessiven Erbgang annimmt, als letzte Ursache der Entstehung eines Erbleidens, also auch der Muskeldystrophie, eine Mutation annehmen; doch liegt diese Mutation weit zurück und ist selten, da sie als rezessive Anlage aufzufassen ist und sich lange verbreiten kann, bevor sie durch Zusammentreffen mit der gleichen Anlage in einem Homozygoten offenbar wird. Nehmen wir z. B. an, in Abb. 1 sei bei x die rezessive Anlage durch Mutation entstanden, so sehen wir erst nach drei Generationen die Krankheit offenbar werden. In dieser Generation zählen wir aber außer dem einen Homozygoten schon 6 heterozygote Anlageträger.

In der Literatur finden sich auch einige schöne Beobachtungen über Stammbäume, aus denen ohne weiteres ein rezessiver Erbgang hervorgeht. Es möge hier ein veröffentlichter Stammbaum folgen:




Abb. 2. (Nach Weitz)

Nach diesem Sippenbild ist anzunehmen, daß sowohl die mit A bezeichnete Frau als auch die Sippe ihres Mannes B Heterozygoten waren. Das gleichzeitige Auftreten der Muskeldystrophie bei Vater und Sohn erklärt sich ebenfalls aus der Annahme, daß die Mutter, die eine Schwester des mit B bezeichneten heterozygoten Mannes ist, ebenfalls heterozygot ist. Die ausführlichste der veröffentlichten Sippen mit rezessivem Erbgang ist die oben erwähnte von *Minkowski-Sidler*. Gerade hier zeigt sich, wie aufschlußreich eine sorgfältige Erforschung der Sippe, auch der anscheinend „isolierten“ Fälle ist. So

konnte von *Minkowski-Sidler* festgestellt werden, daß alle 13 Muskeldystrophiker dieses Stammbaumes untereinander blutsverwandt sind. Wären die Sippen der Probanden nicht so sorgfältig erforscht worden, so hätten die oft weit zurückliegenden Blutsverwandtschaften dem Untersucher entgehen können, und die Kranken wären als „isolierte“ Fälle angesehen worden.

Minkowski und *Sidler* glauben, doppelte Rezessivität annehmen zu müssen, da die Krankheit dann entstand, wenn sich die Erbmassen zweier verschiedener Stämme H. und R. vereinigten. Der von ihnen aufgestellte Stammbaum widerspricht aber auch nicht der Annahme einer einfachen Rezessivität. Auch die angegebenen Zahlenverhältnisse stehen hierzu nicht im Gegensatz, besonders wenn man berücksichtigt, daß hierbei die noch nicht im Erkrankungsalter stehenden Kinder nicht mit herangezogen wurden und in den Familien der letzten Generationen hohe Kleinkindersterblichkeit herrschte.

Zur Darlegung der Häufigkeit des rezessiven Erbganges der Muskeldystrophie sei hier noch einmal auf die Zahlenangaben von *Weitz* zurückgegriffen. *Weitz* gab an, daß rund 62% der ihm bekannten Muskeldystrophiker sogenannte „isolierte“ Fälle waren. Da diese auf rezessiven Erbgang zurückzuführen sind, ist dieser Erbmodus schon nach diesen Zahlen der häufigste.

Ob diese rezessive Anlage auf ihrem Weg durch die Descendenz dominant werden kann, wie *El. Grothaus* annimmt, läßt sich erst entscheiden, wenn einmal größere Stammbäume mit vielen Generationen vorliegen. Immerhin hat man bei manchen veröffentlichten Sippen den Eindruck, als ob in der Descendenz zunehmende Prozentzahlen der Geschwister erkrankten, dies gilt auch von den Knaben in den Fällen, wo geschlechtsgebunden rezessiver Erbgang vorliegt. Doch sind solche Beobachtungen wegen der Unsicherheit der Angaben über frühere Generationen und wegen der stark verminderten Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit in den heutigen Familien nur mit Vorsicht zu deuten.

Im folgenden sollen als Beispiele rezessiven Erbgangs bei der Muskeldystrophie noch vier Stammbäume eigener Beobachtung mitgeteilt werden.

Stammbaum Bi.

- Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 2 heiratete zweimal: Zuerst Nr. 1, dann Nr. 3. Nähere Daten waren über diese Generation nicht mehr zu erhalten.
- Nr. 4. B. geb. 1845, gestorb. im Alter von 67 Jahren. Todesursache: „Gesichtsrose“. Weder bei ihm, noch bei seinen 3 Geschwistern, die sämtlich ein hohes Alter erreichten, 67—75 Jahre, wurde eine Muskeltörung bemerkt.
- Nr. 5. Geb. 1841, gestorb. im Alter von 94 Jahren an „Altersschwäche“. Sie hatte noch 6 Geschwister, 5 Schwestern, 1 Bruder, die alle ein hohes Alter erreichten. 1 Schwester an Schlaganfall gestorben. Von den übrigen nichts genaues mehr bekannt. Alle haben aber ein hohes Alter erreicht.
- Nr. 6. Geb. 1853, gestorb. im Alter von 76 Jahren an Schlaganfall. War vorher nie erheblich krank gewesen.
Nr. 5 und Nr. 6 sind Halbgeschwister. Sie hatten verschiedene Mütter aber einen Vater.
- Nr. 7. Geb. 1850, wurde 71 Jahre alt. Über seine Erkrankungen ist nichts Wesentliches mehr bekannt.
- Nr. 8. Geb. 1808, Landwirt, starb im Alter von 70 Jahren. Als Todesursache wird „Altersschwäche“ angegeben.
- Nr. 9. H. geb. S. Geb. 1835. Starb im Alter von 67 Jahren an unbekannter Todesursache.
- Nr. 10. W. Geb. 1848, Landwirt. Gestorben im Alter von 77 Jahren an „Altersschwäche“.
- Nr. 11. K. W. geb. F. Geb. 1855, gestorb. im Alter von 34 Jahren. Todesursache nicht mehr festzustellen.
- Nr. 12. Im Alter von ungefähr 32 Jahren im Wochenbett gestorben. Sie hatte 4 Kinder, die alle leben und gesund sind.
- Nr. 13. Heutiges Alter 65 Jahre. Hat sich immer gesund gefühlt. 4 gesunde Kinder.
- Nr. 14. Geb. 1873, lebt. Außer Kinderkrankheiten nie ernstlich krank gewesen.
- Nr. 15. Lebt, heute 60 Jahre alt. Ist immer gesund gewesen, 3 gesunde Kinder.
- Nr. 16. 53 Jahre alt. Nie ernstlich krank gewesen. 7 gesunde Kinder.
- Nr. 17. Geb. 1875, lebt noch und ist gesund.
- Nr. 18. 58 Jahre alt. Gesund.
- Nr. 19. 44 Jahre alt, immer gesund gewesen.
- Nr. 20. Im Alter von 37 Jahren gestorben. Als Todesursache gibt die Familie „Unterleibskrankheit“ an.

- Nr. 21. Im Weltkrieg gefallen. Vorher immer gesund gewesen.
Nr. 22. 42 Jahre alt, gesund.
Nr. 23. 40 Jahre alt, gesund.
Nr. 24. 37 Jahre alt, gesund.
Nr. 25. P. H. Lebt noch, geboren 1874, Invalide, keine Muskelerkrankung.
Nr. 26. Geb. 1878. Starb im Alter von 25 Jahren im Wochenbett an „Lungenentzündung und Hirnhautentzündung“.
Nr. 27. Ist im Alter von 17 Jahren gestorben. Todesursache war nicht mehr bekannt.
Nr. 28. Im Alter von 12 Jahren gestorben. Todesursache: „Herzmuskelentzündung“.
Nr. 29. Im Alter von 23 Jahren gestorben. Todesursache „Grippe“.
Nr. 30. Starb im Alter von 15 Jahren an „Krämpfen“.
Nr. 31. K. B. Leidet an progressiver Muskeldystrophie. Geb. 1900.

Die Diagnose wurde durch stationäre Beobachtung in der medizinischen Klinik erhärtet.

Anamnese: Patient gibt an, zur rechten Zeit laufen gelernt zu haben. An Kinderkrankheiten kann er sich nicht mehr erinnern. Außer der jetzigen Erkrankung will er nie ernstlich krank gewesen sein. Im Jahre 1917 wurde er zum Militärdienst eingezogen und machte Dienst als Pionier. Im Herbst 1917 fiel ihm auf, daß seine Fußgelenke geschwollen waren und seine Beine schnell ermüdeten. Dem schweren Pionierdienst war er nicht mehr gewachsen und machte bis zu seiner Entlassung 1918 Dienst als Burfsche. Patient sagt, sein Zustand habe sich nach 1918 wieder etwas gebessert; er führt dies auf eine Kur eines Homöopathen, die aus Lehmpackungen, Kaltwasserbehandlung und Tabletten bestanden habe, zurück. Er war daraufhin von 1923 bis 1926 als Gefelle und von 1927 bis 1930 im eigenen Betrieb als Schreiner tätig. Er habe allerdings auch damals über schnelle Ermüdbarkeit der Beine zu klagen gehabt. 1930 habe diese Schwäche in den Beinen stark zugenommen, besonders, gibt Patient an, als er einmal unter einer schweren Traglast zusammengebrochen sei. Jetzt konnte er auch seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Von 1932 an war Gehen nur noch mit Stock möglich. Eine vom Patienten durchgemachte Rheumakur habe keine Besserung gebracht. Gelenkschwellungen will er seit dem Kriege nicht mehr beobachtet haben. Sonst keine Beschwerden. Nikotin und Alkoholgenuß sehr mäßig.

Befund: 1,85 m großer Patient in gutem Kräfte- und Ernährungszustand. Haut und Schleimhäute ausreichend durchblutet.

Kopf: Normal configuriert, nicht druck- oder klopfempfindlich. Nervenaustrittsstellen frei. Zunge nicht belegt, wird gerade aber

etwas zitternd herausgestreckt. Gebiß schadhaft, Gaumenbogen und Tonfillen o. B. Keine Drüenschwellungen am Hals, keine Struma. Thorax: Symmetrisch gebaut, etwas flach, ausreichende Atemexkursionen. Lungen: Grenzen: vorne 6. Rippe, hinten 11—12 B. W. Grenzen gut verschieblich, auscult. u. percutor. kein pathol. Befund. Herz: rel. Grenzen: R. 2,5 cm, L. 9,5 cm, oben: 3. Rippe. Herzspitzenstoß innerhalb der Mammillarlinie. Gespaltener 2. Ton. $A_2 = P_2$. Rhythmus regelmäßig, Puls gut gefüllt. Abdomen: Weiche Bauchdecken, gut eindrückbar. Keine pathol. Resistenzen, palpabel, kein Druckschmerz. Leber nicht vergrößert, Niere, Milz, Genitale o. B. Bewegungsapparat:

	R.	L.
Reflexe: Patellarsehnenreflex	Ø	Ø
Achillessehnenreflex	Ø	Ø

Alle übrigen Reflexe in normaler Stärke auslösbar, keine pathologischen Reflexe auslösbar.

Sensibilität intakt. Romberg Ø. Keine Ataxie.

Schulterheben nur bei geringer Belastung möglich. Leichte Flügelstellung der Scapulae angedeutet. Seitliches Heben der Arme möglich. Leicht lordotische Haltung, vor allem der Lendenwirbelsäule. Hand- und Gesichtsmuskulatur frei. Patient geht unsicher und breitbeinig, etwas watschelnd. Beim Hochheben des Fußes sind Fußspitze und lateraler Fußrand gesenkt. Stehen auf einem Bein ist nicht möglich, da das andere beim Versuch des Hochhebens sofort wieder herunter sinkt.

Die Muskulatur der oberen Extremität erscheint am Oberarm leicht atrophisch. An den Oberschenkeln zeigt sich links Atrophie, rechts mehr geringe Pseudohypertrophie. Die Unterschenkelmuskulatur erscheint nicht atrophisch, doch ist die grobe Kraft stark herabgesetzt. Die Sensibilitätsprüfung ergab nichts pathologisches. Die elektrische Prüfung zeigte bei faradischer Reizung eine Untererregbarkeit der Muskulatur der rechten unteren Extremität. An keinem Muskel war eine Entartungsreaktion festzustellen. Beim Aufrichten aus horizontaler Lage kniet sich Patient zuerst hin und klettert dann in typischer Weise mit den Händen an seinen Oberschenkeln hoch. Patient wird mit Glykokoll behandelt.

Die Kreatinbelastung zeigte am 21. 8. 1936 eine Ausscheidung von 90%, am 7. 10. 1936 eine Ausscheidung von 53%. Wa.R. Ø. R.R. 110/90. Gew. 80 kg.

Die Umfangsmessungen von 21. 8. 1936 ergaben eine Atrophie des linken Oberschenkeles gegenüber dem rechten. Brustumfang: inspir. 98 cm, expir. 94 cm,

- Nr. 32. Ehefrau des Muskeldystrophikers. Geb. 1900, ist gefund. War einmal an Rheumatismus erkrankt.
- Nr. 33. Geb. 1924. Lernte mit 14 Monaten laufen. Mit 2 Jahren Mafern, mit 5 Jahren Keuchhusten durchgemacht. Später nie mehr krank gewesen. Die Untersuchung ergibt einen dem Alter entsprechenden Kräfte- und Entwicklungsstand. Über der Herzspitze leichtes Systolicum mit klappendem zweiten Ton. Sonst kein krankhafter Befund.
- Nr. 34. Lernte mit 13 Monaten laufen. Im Alter von $\frac{3}{4}$ Jahren „Milchschorf“, nie ernstlich krank gewesen. Schlanker, magerer Junge, gleicht seinem Vater. Lunge und Herz ohne krankhaften Befund. R.R. 105/70. Heute 8 Jahre alt. Motilität und Sensibilität ungestört. Etwas absteigende Schulterblätter.
- Nr. 35. Geb. 1935, mit 14 Monaten Laufen gelernt. Im 1. Lebensjahr Mafern durchgemacht. Normal entwickeltes Kind ohne irgendwelchen pathol. Befund.

Vorliegender Stammbaum B. umfaßt 35 Personen, von denen 18 nicht mehr leben. Der Proband, seine Ehefrau und seine Kinder konnten in der medizinischen Klinik untersucht werden.

In dieser Sippe tritt ein Kranker auf, in der Ascendenz ließ sich eine Verwandtenehe nachweisen: Die Großmütter des Probanden väterlicher- und mütterlicherseits sind Kinder eines Vaters. Dies legt den Verdacht nahe, daß die Krankheit des Probanden Nr. 31 durch das Zusammentreffen zweier Heterozygoten aus rezessiver Anlage entstanden ist. Wir müssen dann annehmen, daß Nr. 2 heterozygot war. Das gleiche gilt von seinen Töchtern Nr. 5 und Nr. 6. Ebenso waren von deren Nachkommen mindestens Nr. 14 und Nr. 17 Heterozygoten. Aus ihrer Ehe stammt der Kranke. Bei den Geschwistern des Kranken ist zu Lebzeiten keine Muskeldystrophie festgestellt worden. Da sie aber fast alle schon in einem Alter gestorben sind, in dem auch der Proband noch nichts von seinem Leiden bemerkt hatte, sind daraus keine bindenden Schlüsse zu ziehen.

Der Proband erkrankte in einem Alter von 17 Jahren. Nach der klinischen Untersuchung handelt es sich um progressive Muskeldystrophie mit juvenilem Beginn bei initialem und fast alleinigem Befall der Beckengürtel- und Oberschenkelmuskulatur. Die 3 Kinder

des Kranken sind gesund, sind allerdings noch nicht im Erkrankungsalter des Vaters.

Es folgen die Daten der Personen des Stammbaumes S.

- Nr. 1. H. S. Geb. 1792, starb im Alter von 90 Jahren. Als Todesursache wird „Alterschwäche“ angegeben. Soll immer gesund gewesen sein.
- Nr. 2. B. L. Geb. 1797, starb im Alter von 92 Jahren an „Herzschlag“.
- Nr. 3. V. L. Landwirt, geb. 1802, wurde 90 Jahre alt.
- Nr. 4. K. L. geb. M. Geb. 1807. Starb im Alter von 92 Jahren, Todesursache nicht mehr bekannt.
- Nr. 5. H. D. Geb. 1815, starb im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Unfalles. War vorher stets gesund.
- Nr. 6. K. D. Etwa 1812 geboren, nähere Daten waren nicht mehr festzustellen.
- Nr. 7. P. H. Geb. 1813, wurde 85 Jahre alt, Todesursache nicht mehr bekannt.
- Nr. 8. Geb. 1817. Starb im Alter von 76 Jahren. Todesursache unbekannt.
- Nr. 9. Geb. 1822, starb im Alter von 54 Jahren an „Lungenentzündung“.
- Nr. 10. Geb. 1831, starb im Alter von 87 Jahren. Als Todesursache wird „Alterschwäche“ angegeben. War sonst nie ernstlich krank.
- Nr. 11. Starb im hohen Alter, näheres nicht mehr festzustellen.
- Nr. 12. B. D. Geb. 1845, starb im Alter von 66 Jahren an „Lungenentzündung“.
- Nr. 13. War nie ernstlich krank, erreichte ein hohes Alter.
- Nr. 14. Nichts Näheres mehr bekannt.
- Nr. 15. Geb. 1843, starb im Alter von 67 Jahren an „Rippenfellentzündung“. Vorher war sie stets gesund und im Haushalt tätig.
- Nr. 16. Hat ein hohes Alter erreicht, war nie ernstlich krank.
- Nr. 17. Erreichte ein hohes Alter. War gesund.
- Nr. 18. Wurde etwa 1866 geboren, gesund, kann sich nicht an Krankheiten erinnern, 2 Kinder.
- Nr. 19. Ziegelmeister a. D. Geb. 1867. Ist gesund. An Kinderkrankheiten kann er sich nicht mehr erinnern. Auch später will er nie ernstlich krank gewesen sein. Bis zu seiner Invalidisierung wegen Alters hat er stets seinem schweren Beruf nachgehen können. Irgendein Anhalt für eine larvierte Form der Muskeldystrophie, Muskeldefekte u. ä. läßt sich nicht finden. 6 Kinder.
- Nr. 20. Landwirt. Geb. 1871. Arbeitet heute noch. Keine Muskel-

defekte. Seine Ehefrau starb 1935 im Alter von 67 Jahren an „Herzschlag“. 3 Kinder.

- Nr. 21. Geb. 1867, gesund. Sie verrichtet auch heute noch alle Hausarbeiten. Will nie ernstlich krank gewesen sein. Auch sie zeigt kein Zeichen einer Muskeldystrophie. Von ihren 6 Kindern leiden 2 an progressiver Muskeldystrophie, die 4 anderen sind gesund.
- Nr. 22. E. B. Geb. 1869, gibt an, niemals besonders krank gewesen zu sein, arbeitet im Haushalt. In letzter Zeit machen sich zunehmend Verdauungsstörungen und Abmagerung bemerkbar. Der Hausarzt nimmt ein malignes Neoplasma des Verdauungstraktes an.
- Nr. 23. Starb 1927 an „Schlaganfall“. Vorher soll er an Blasenkrebs gelitten haben.
- Nr. 24. Ist ledig, lebt bei ihrer Mutter. Ist gesund.
- Nr. 25. Im Weltkrieg gefallen. Landwirt. War gesund und verrichtete alle Arbeiten.
- Nr. 26. G. S. Geb. 1898, gesund.
- Nr. 27. Geb. 1902, gesund.
- Nr. 28. Geb. 1904, gesund.
- Nr. 29. G. S. geb. S. Geb. 1892. Als Kind machte sie Lungenentzündung durch. Im Alter von 16—17 Jahren erkrankte sie gleichzeitig mit ihren beiden später an Muskeldystrophie leidenden Geschwistern an Scharlach. Seitdem ist sie nie ernstlich krank gewesen; verrichtet alle Hausarbeiten und ist vollkommen gesund. Sie ist mit gesundem Mann verheiratet und hat 3 gesunde Kinder.
- Nr. 30. K. M. geb. S. Geb. 1894. Als Kind an Masern erkrankt, seitdem stets gesund. 1 Kind.
- Nr. 31. Ehegatte von Nr. 30, selbst gesund, doch sollen in seiner Familie gehäuft „Nervenkrankheiten“ vorkommen.
- Nr. 32. F. S. leidet an Dystrophia musculorum progressiva. Anamnese: Patientin wurde 1895 geboren. Als Kind ist sie gesund gewesen. Mit 13 Jahren wurde sie von ihrer älteren Schwester Nr. 29 mit Scharlach infiziert, an dem sie schwer erkrankte. (Dieser Scharlach wird von der Familie für die kurz darauf beginnende progressive Muskeldystrophie verantwortlich gemacht, s. u.). Mit 14 Jahren begannen die Symptome der Muskeldystrophie. Zuerst seien die Waden dick und hart geworden, bald darauf auch die Oberschenkelmuskulatur. Zuletzt habe sich das Leiden auch auf die Rückenmuskulatur ausgedehnt. Seit 13 Jahren kann die Patientin nicht mehr gehen. Im Laufe der Zeit hat das Leiden auch die Muskelgruppen des Schultergürtels befallen.
- Befund: Die Patientin ist ca. 1,55 m groß und stark adipös. Gewicht um 78 bis 80 kg. Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet.

Kopf: Nicht druck- und klopfempfindlich, Nervenaustrittsstellen frei. Sinnesorgane äußerlich o. B. Zähne intakt. Keine Drüenschwellungen am Halse, keine Struma, Kehlkopf mittelföndig.

Thorax: Symmetrisch configuriert. Ausreichende Atemexkursionen.

Pulmones: Grenzen: vorne 6 Rippe, hinten 10—11 B. W. D. Lungen sind percut. und auscultatorisch o. B.

Herz: Rel. Grenzen: R. 2,5 cm L. 9,0 cm oben 3 Rippe. Leichtes systolisches Geräusch über der Herzspitze. 2. Ton rein. Rhythmus regelmäßig, Puls gut gefüllt.

Abdomen: Sehr fettreiche Bauchdecken, keine pathologischen Resistenzen palpabel, kein Druckschmerz, keine Muskelfpannung. Leber nicht vergrößert. Niere, Milz o. B. Äußere Genitalien normal. Sensibilität intakt. Psych. Verhalten unauffällig. Wa. R. Ø, Blutk. Senkung 25—47. R.R. 155/95. Temperaturen normal.

Extremitäten: Passive Beweglichkeit in allen Richtungen möglich, aktive Beweglichkeit an den unteren Extremitäten unmöglich, an den oberen Extremitäten stark reduziert.

	R.	L.
Reflexe: Bauchdeckenreflexe	Ø	Ø
Patellarsehnenreflexe	Ø	Ø
Achillessehnenreflexe	Ø	Ø

Alle anderen Reflexe sind in normaler Stärke auslösbar, pathologische Reflexe sind nicht nachzuweisen. Blutbild ohne Besonderheiten.

Kreatinbelastung: Von 3 g Kreatin wurden 38 % ausgeschieden.

Die Umfangsmessungen vom 25. 5. 1935 ergaben eine Pseudohypertrophie der unteren Extremitäten, vor allem rechts. Untere Extremitäten können aktiv nicht mehr bewegt werden, die Arme werden noch bis etwa 10° über die Horizontale gehoben.

Der Zustand bei der Nachuntersuchung am 27. 1. 1936 war nicht wesentlich gegen den Status vom 25. 5. 1935 verändert. Lediglich die Umfangsmessungen ergaben eine deutliche Abnahme der Pseudohypertrophie an den Unterfchenkeln und Oberarmen.

Nr. 33. W. S. Leidet an Dystrophia musculorum progressiva. Geboren 1897.

Anamnese: Als Kleinkind ist Patient nie krank gewesen. Im Alter von 10—11 Jahren erkrankte er gleichzeitig mit seinen beiden älteren Schwestern an Scharlach. Im 13. Lebensjahr begann eine allmählich an Stärke zunehmende Schwäche beider Beine. Treppensteigen fiel ihm schwer. 1—2 Jahre später habe er auch ein Schwächerwerden der Arme beobachtet. Trotz dieser Beschwerden konnte er noch bis 1923 als Drahtzieher meist stehend arbeiten, doch waren die Gehstörungen schon so weit fortgeschritten, daß er zur Arbeits-

stätte gefahren werden mußte. 1923 konnte er nur noch ganz kurze Zeit stehen, weswegen er invalidisiert wurde. Er mußte jetzt fast dauernd sitzen oder liegen. Gehen war nur mit fremder Hilfe oder auf einen Stock gestützt möglich. Heute kann sich der Patient auch mit Stöcken nicht ohne fremde Hilfe fortbewegen. Schlaf und Appetit gut. Miktion und Stuhlgang regelmäßig, nie unwillkürlich. Alkohol und Nikotingenuß: mäßig.

Befund: Mittelgroßer schlanker Mann in gutem Ernährungszustand. Haut und Schleimhäute blaß.

Kopf: Regelrecht configuriert, behaart. Nicht druck- und klopfempfindlich. Nervenaustrittsstellen frei. Sinnesorgane äußerlich o. B. Zähne z. T. defekt. Zunge nicht belegt, wird ohne Zittern vorge-
streckt. Tonillen und Rachen o. B. Am Halse keine Drüenschwellung, keine Struma, Kehlkopf in der Mittellinie

Thorax: Mäßig gewölbt. Deutliche Skoliose der Brust und Lendenwirbelsäule. Mäßige Atemexkursionen. Pulmones: Grenzen: vorne 6. Rippe, hinten: 11 B. W. D. auscult. und percut. o. B. Cor: Rechts 3,5 cm, links 10,0, oben 4 Rippe.

Töne rein, Aktion regelmäßig. Die Röntgenaufnahme des Thorax zeigte leichtes Emphysem und Stauungszeichnung der Lungen, sonst kein pathol. Befund.

Abdomen: Bauchdecken weich, fettarm. Keine pathologischen Resistenzen palpabel, kein Druckschmerz, Leib etwas aufgetrieben. Leber nicht vergrößert. Niere und Milz o. B. Genitale normal.

Reflexe:

Bauchdeckenreflexe

Patellarsehnenreflexe

Achillessehnenreflexe

beiderf. Ø.

Die übrigen Reflexe waren in normaler Stärke auslösbar. Pathologische Reflexe konnten nicht ausgelöst werden. Romberg nicht prüfbar. Geringer Tremor der Hände. Gesicht- und Halsmuskulatur o. B. Die grobe Kraft von Pectoralis, Deltoideus, Triceps und Biceps ist beiderseits herabgesetzt. Unterarmmuskulatur ist nicht beeinträchtigt. Handmuskeln sind intakt. Rumpfmuskulatur ist nur wenig befallen. Die Lendenwirbelsäule ist deutlich lordotisch. Die Glutaei, Iliopsoas, Adduktoren, Abduktoren, die Beuger und der Quadriceps sind paretisch. Unterschenkelmuskeln beiderseits ziemlich kraftlos. Die elektrische Prüfung ergab eine quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit für beide Stromarten. Keine Entartungsreaktion. Sensibilität intakt.

Wa.R. Ø. R.R. 125:80, 145:90. Normale Temperaturen.

Die Umfangsmessungen am 15. 6. 1935 ergaben rechts und links eine gleichmäßige, unwesentliche Atrophie.

Ergometerversuch:

Am 23. 5. 1935. Rechte Hand 40, linke Hand 20.

Am 8. 6. 1935. Rechte Hand 40, linke Hand 15.

Subjektiv gibt der Patient Kribbeln in den Händen an.

Die Kreatinverwertung betrug 30%. Die Nachuntersuchung am 30. 1. 1936 zeigte den gleichen Befund.

- Nr. 34. J. S. Geb. 1901, gesund. Arbeiter. Muskelkräftiger Mann, der alle Arbeiten verrichtet. Keine Muskeldefekte. Ist mit gesunder Frau verheiratet und hat 7 gesunde Kinder.
- Nr. 35. A. Sch. Geb. 1905, gesund. Ist außer geringfügigen Kinderkrankheiten stets gesund gewesen.
- Nr. 36. K. Ha. geb. B. 37 Jahre alt. Will nie ernstlich krank gewesen sein. Verrichtet alle Hausarbeiten. 3 gesunde Kinder.
- Nr. 37. F. B. Ledig, 35 Jahre alt. Leidet an Epilepsie. Sie verrichtet zwar jegliche Haus- und Feldarbeit, ist aber durch tägliche Anfälle stark behindert. Bei regelmäßiger Luminomedikation lassen sich die Anfälle stark unterdrücken. Weiter klagt sie über Dysmennorrhoeen.
- Nr. 38. Ist im Alter von 28 Jahren verunglückt. Hat früher im landwirtschaftlichen Betrieb alle Arbeiten verrichten können.
- Nr. 39. J. B. Ca. 30 Jahre alt, gesund.
- Nr. 40. Hat sich immer gesund gefühlt. Ehemann gesund. 2 Kinder.
- Nr. 41. Gesund, 1 Kind.
- Nr. 42. Starb im Alter von ca. 3 Monaten an Diphtherie.
- Nr. 43. Starb, einige Tage alt, an Krämpfen.
- Nr. 44. Männliche Totgeburt.
- Nr. 45. M. S. 21 Jahre alt. Hausangestellte. Gesund und kräftig. Nur als Kind an Kinderkrankheiten erkrankt gewesen.
- Nr. 46. 18 Jahre alt. Arbeitet auf einem Fabriklager. Gesund und kräftig. Ist zum Arbeitsdienst angemustert und will Berufssoldat werden.
- Nr. 47. 13 Jahre alt. Ist immer gesund und kräftig gewesen. Zeigt für ihr Alter normale Entwicklung.
- Nr. 48. 21 Jahre alt. Er soll schon als Kind an „Krämpfen“ gelitten haben. Während der Schulzeit sei er unauffällig gewesen. Später habe er jedoch „Anfälle“ bekommen. Er ist heute vollständig ans Bett gebunden, psychisch stumpf. Der Hausarzt spricht sich für einen postenzephalitischen Zustand aus. Eine Kombination mit Dystrophia muscul. progressiva ist abzulehnen.
- Nr. 49—55. 7 Kinder von Nr. 34, 3 männl., 4 weiblich. Alle Kinder sind außer an leichten Kinderkrankheiten nie ernstlich krank gewesen. Bei keinem bietet sich Anhalt für die Annahme einer be-

ginnenden Muskeldystrophie. Der älteste Knabe ist 14 Jahre alt und sehr kräftig, er leistet z. B. den beiden Muskeldystrophikern Nr. 32 und Nr. 33 körperliche Hilfe.

Nr. 56—58. 3 Kinder im Schulalter. Normal und kräftig entwickelt.

Nr. 59. Mädchen im Alter von 2 Jahren. Nie krank gewesen, lernte rechtzeitig laufen und ist für sein Alter kräftig entwickelt.

Nr. 60. u. 61. Knabe und Mädchen im Kleinkindesalter, gesund und normal entwickelt.

Nr. 62. 3 Jahre altes Mädchen, gesund und kräftig. Hat rechtzeitig Laufen gelernt.

Der Stammbaum Sch. umfaßt 62 Personen, von denen 23 gestorben sind. Von den restlichen 39 wurden 30 zu Hause aufgesucht, die beiden Probanden waren in stationärer Beobachtung in der medizinischen Klinik. Zwei Personen wurden durch hausärztliche Gutachten, die übrigen durch Fragebogen erfaßt. In einer Familie dieser Sippe erkrankten zwei Personen an progressiver Muskeldystrophie. Weder bei ihren Eltern noch bei den weiteren Geschwistern und deren Nachkommen konnte ein ähnliches Krankheitsbild gefunden werden. Auch wurde kein „Typ“ im Sinne *Diehl, Hansen, v. Ubischs* gefunden. Die beiden Kranken, ein Mann und eine Frau, erkrankten beide im juvenilen Alter etwa um das 14. Lebensjahr. Bei beiden ist vorwiegend Oberschenkel-, Becken- und Rückenmuskulatur befallen. Während der Mann äußerlich normalen Habitus bietet, ist die Frau, deren Muskelgruppen auch schwerer befallen sind, auffallend adipös.

An sonstigen Erkrankungen in dieser Sippe wäre noch die Epilepsie der Cousine (Nr. 27) der beiden Kranken zu nennen. Irgendein Zusammenhang mit der Muskeldystrophie ist jedoch abzulehnen.

Die Familie gibt an, die ersten Symptome der Muskeldystrophie hätten sich bei den beiden Probanden im Anschluß an einen Scharlach eingestellt. *Jendrassik* will öfters die ersten Erscheinungen der Muskeldystrophie in Anschluß an Infektionskrankheiten gesehen haben. Im gleichen Sinne spricht eine Beobachtung von *Minkowski-Sidler*, die die ersten Symptome nach einem Keuchhusten auftreten sahen. Ein Kausalzusammenhang zwischen diesen Infektionskrank-

heiten und der Muskeldystrophie ist jedoch nicht anzunehmen. Man wird sich dies vielmehr so denken müssen, daß die durch die Muskeldystrophie schon weniger widerstandsfähigen Muskeln durch die Einwirkung der Infektionskrankheit so geschwächt werden, daß nun plötzlich die ersten Symptome der Muskeldystrophie auftreten. Auch ohne die Infektionskrankheiten wäre natürlich das Erbkleiden aufgetreten, wenn auch möglicherweise zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Auch *Curtius* hält mit *A. Jakob* und *Meggendorfer* die Auslösung erster Symptome von Heredopathien durch eine Infektionskrankheit für möglich.

Wir sehen also in dieser Sippe das sporadische Auftreten der progressiven Muskeldystrophie bei zwei Geschwistern. Diese Tatsache spricht an sich gegen eine Entstehung durch eine neue Mutation. Vielmehr muß hier rezessiver Erbgang angenommen werden, wobei die Eltern der Probanden Heterozygoten wären. Beide Probanden erkrankten ungefähr im gleichen Alter, ihre Krankheitsbilder sind in Bezug auf die befallenen Muskelgruppen weitgehend homolog.

Stammbaum E.

- Nr. 1. M. E. Geb. 1763, gestorben im Alter von 66 Jahren. Todesursache unbekannt.
- Nr. 2. A. E. geb. S. Geb. 1757, gestorben im Alter von 87 Jahren.
- Nr. 3. G. M. Im hohen Alter gestorben.
- Nr. 4. T. B. Nähere Daten waren nicht mehr zu erheben.
- Nr. 5. M. B. Geb. 1768, im Alter von 55 Jahren gestorben. Todesursache unbekannt.
- Nr. 6. A. B. Geb. 1763, gestorben im Alter von 72 Jahren.
- Nr. 7. P. H. Nähere Daten unbekannt.
- Nr. 8. E. H. Nähere Daten unbekannt.
- Nr. 9. J. L. Nähere Daten unbekannt.
- Nr. 10. A. H. Nähere Daten unbekannt.
- Nr. 11. A. E. Geb. 1796. Starb im Alter von 77 Jahren an den Folgen eines Unfalles.
- Nr. 12. T. E. Geb. ca. 1862, gestorben im Alter von 47 Jahren. Von ihr ist noch bekannt, daß sie an „Wasserfucht“ gelitten hat.
- Nr. 13. F. B. Geb. 1798, gestorben im Alter von 49 Jahren.
- Nr. 14. C. H. Geb. 1797, gestorben im Alter von 41 Jahren.
- Nr. 15. M. W. Geb. 1815. Wurde 70 Jahre alt.

- Nr. 16. A. L. Geb. 1813, starb im Alter von 86 Jahren an „Altersschwäche“.
- Nr. 17. P. S. Wurde 92 Jahre alt.
- Nr. 18. J. S. geb. L. Wurde 70 Jahre alt.
- Nr. 19. A. E. Geb. 1834, gestorben im Alter von 34 Jahren an unbekannter Todesursache. Er hatte keine Geschwister.
- Nr. 20. Nichts Näheres mehr bekannt.
- Nr. 21. Cl. E. geb. B. Wurde 55 Jahre alt. Starb an den Folgen eines Unfalles (Sturz in eine Heugabel). Nr. 21 war zweimal verheiratet.
- Nr. 22—24. Über Alter, Krankheiten und Todesursachen nicht Sicheres mehr bekannt, doch soll keiner an „Lähmungen“ und Gehstörungen gelitten haben.
- Nr. 25. Erster Gatte von Nr. 21. Starb im rel. jugendlichen Alter. Krankheiten und Todesursache nicht mehr bekannt.
- Nr. 26. K. W. Im jugendlichen Alter gestorben.
- Nr. 27. Geb. 1842, starb im Alter von 60 Jahren an „Lungenentzündung“.
- Nr. 28. Fr. S. geb. W. Im hohen Alter gestorben.
- Nr. 29. Fr. H. geb. W. Im hohen Alter gestorben.
- Nr. 30. E. W. geb. Sch. Geb. 1848, starb im Alter von 38 Jahren in einer Bonner Klinik angeblich an „Gehirnschlag“.
- Nr. 31—33. Geschwister S. sind nach Amerika ausgewandert. Sie selbst und ihre Nachkommen sind den hiesigen Familienmitgliedern nicht mehr bekannt.
- Nr. 34. J. E. Geb. 1864. Landwirt und invalidisierter Fabrikarbeiter. Hat rechtzeitig Laufen gelernt. An ernstere Kinderkrankheiten will er sich nicht mehr erinnern können. Heute leidet er zeitweise an Asthma, das stark von der Witterung abhängig ist. Er führt die Erkrankung auf eine Berufschädigung zurück, der er als Arbeiter in einer Pulverfabrik ausgesetzt war. Motilität und grobe Kraft intakt. Keine partiellen Muskeldefekte.
- Nr. 35. K. E. Lebt in Amerika. Aufenthaltsort und evtl. Nachkommen unbekannt.
- Nr. 36. Im Alter von 22 Jahren gestorben. Er habe immer an „Drüenschwellungen“ gelitten.
- Nr. 37. Nr. 38. Töchter von C. E. (Nr. 21) mit ihrem ersten Gatten (Nr. 25). Während die Frau Nr. 37 ein hohes Alter erreichte, starb Nr. 38 im Alter von etwa 20 Jahren an „Drüsenfieber“.
- Nr. 39. Zwillinge, kurz nach der Geburt gestorben.
- Nr. 40. Ca. 60 Jahre alt, gesund.
- Nr. 41. M. Sch. Lebt und ist gesund.
- Nr. 42. W. H. Gesund.

- Nr. 43. H. geb. H. Lebt und ist gesund, verheiratet, keine Kinder.
- Nr. 44. M. E. geb. W. Geb. 1867, lebt und ist gesund. Sie kann sich an frühere Kinderkrankheiten nicht mehr erinnern. Verrichtet häusliche Arbeiten in Haus und Hof. Motilität ungestört.
- Nr. 45. Witwe, kinderlos. 67 Jahre alt, gesund.
- Nr. 46. Heute ca. 60 Jahre alt, Bergmann im Ruhrgebiet. Gesund.
- Nr. 47. K. W. 52 Jahre alt, Keine Kinder, gesund.
- Nr. 48. M. K. geb. E. 43 Jahre alt, hat nur Kinderkrankheiten durchgemacht, sonst nie ernstlich krank gewesen. Lernte rechtzeitig laufen, Motilität auch heute ungestört, gesund. Ist mit gesundem Mann verheiratet und hat 6 gesunde Kinder.
- Nr. 49. K. W. geb. E. 41 Jahre alt. Ist nie ernstlich krank gewesen. Motilität ungestört. Verheiratet, 2 gesunde Kinder.
- Nr. 50. K. E. Leidet an Dystrophia musculorum progressiva. War in der med. Klinik in stat. Beobachtung. Geboren 1897. Beruf: Maurer. Anamnese: Patient hat rechtzeitig laufen gelernt. Als Kleinkind machte er Maßern durch. Weiterhin war er stets gesund. Im Weltkrieg erlitt er 1916 einen Lungensteckschuß rechts. Anschließend erkrankte er an Thyphus abdominalis. 1917 fiel dem Patienten zuerst auf, daß er viel schneller als früher ermüdete. Er wurde rasch kraftloser, vor allem in den Beinen, sein Gewicht nahm dabei ziemlich stark zu. Seit 1924 kann der Patient keine Arbeit mehr verrichten. Außer der Muskelkrankheit klagt Patient noch über Atemnot und stechende Schmerzen in der rechten Lunge (Kriegsverletzung). Befund: Mittelgroßer Mann in gutem Ernährungszustand. Größe 1,72 m, Gewicht ca. 72 kg. Haut und Schleimhäute gut durchblutet. Temperaturen normal. Wa. R. Ø, Blutkörperchenk. 8—16. Kopf: Normal configuriert. Nicht druck- und klopfempfindlich. Sinnesorgane äußerlich o. B. Nerv. V und VII frei. Zunge nicht belegt, wird ohne Zittern herausgestreckt. Gebiß schadhaft. Tonsillen und Rachenring o. B. Am Hals keine Drüenschwellungen, Kehlkopf in der Medianlinie. Thorax: Gut gewölbt, ausgiebige Atemexkursionen. Rechts vorne 6 cm lange etwas empfindliche Narbe. Rechts hinten in Höhe des 5. B.W.D. reaktionslose Narbe. (Op.-Narbe) Pulmones: Perkussion: o. B. Auscultatorisch ist über der Operationsnarbe rechts hinten verschärftes Atemgeräusch festzustellen. Sonst o. B. Cor: rechts 4 cm, links 8 cm oberhalb 3. Rippe (rel. Grenzen) Töne rein, Rhythmus regelmäßig, Puls weich. Abdomen: Weiche, gut eindrückbare Bauchdecken. Keine pathologischen Resistenzen palpabel, kein Druckschmerz, keine Muskelfspannung. Leber nicht vergrößert. Nieren und Genitale o. B.

Bewegungsapparat:

Patellarsehnenreflexe beiderf.

Ø

Achillessehnenreflexe

Ø

Sonstige Reflexe sind in normaler Stärke auslösbar. Pathologische Reflexe sind nicht nachweisbar. Passive Beweglichkeit in allen Gelenken intakt. Sensibilität ungestört. Kein Tremor. Kein Romberg. Keine Ataxie. Die langen Rückenstrecker sind atrophisch und funktions-schwach. Iliopsoas, Glutaeus medius und Quadriceps sind beiderseits atrophisch. Mäßige Pseudohypertrophie der Waden, rechts stärker als links. Schultergürtel und mimische Gesichtsmuskulatur nicht befallen. Der Patient „klettert“, wenn er sich aus vorgeneigter Stellung erheben will, in typischer Weise mit den Händen an seinen Beinen hoch. Kreatinurie: ca. 100—110 mg täglich. Der Belastungsversuch mit 3,0 Kreatin ergab eine Ausscheidung von 40%.

Grundumsatz: 1686 kal mit einem Sollumsatz von 1650, eine Steigerung von + 3, die innerhalb der Fehlergrenzen liegt.

Nr. 51. M. E. Starb 1919 im Alter von 21 Jahren an „Rippenfellentzündung“.

Nr. 52. C. E. 33 Jahre alt, ledig, Hausangestellte. Nie ernstlich krank gewesen. Zwillingsskind, der Zwillingssbruder starb kurz nach der Geburt.

Nr. 53. J. A. geb. E. 30 Jahre alt. Ist stets gesund gewesen. Verheiratet. Noch keine Kinder.

Nr. 54. J. E. Leidet an Dystrophia musculorum progressiva. Geb. 1907. Beruf: Fabrikarbeiter. In der med. Klinik stationär beobachtet.

Anamnese: Patient lernte im Alter von einem Jahr laufen. Angeblich habe er keine Kinderkrankheiten durchgemacht. Auch in der Schulzeit und später im Beruf will er nie ernstlich krank gewesen sein. Er habe aber schon kurz nach der Schulentlassung (1921) gemerkt, daß er sich aus gebückter Stellung nicht mehr gut aufrichten konnte. Er habe das Gefühl gehabt, „als sei im Rücken etwas nicht richtig“. Da diese Beschwerden zunächst nicht stärker wurden, er auch keine Schmerzen gehabt habe, habe er nicht weiter darauf geachtet. Vor vier Jahren fiel dem Patienten dann auf, daß er keine rechte Kraft zum Laufen mehr in den Beinen hatte, während er früher angeblich gut laufen konnte. Auch Heben sei nicht mehr so gut gegangen. Während er früher mühelos 50 kg heben können, bringt er jetzt nur noch ca. 25 kg hoch. Zu diesen Beschwerden seien in letzter Zeit noch Müdigkeit und leichte Schmerzen, sowie ein krampfartiges Gefühl in den Kniekehlen besonders rechts hinzugekommen. Dieser Zustand habe 2—3 Jahre unverändert angehalten. Vor einem Jahr bemerkte Patient, daß er beim bergauf- und bergabgehen mit dem

rechten Bein zusammenfackte. Beim Gehen im Dunkeln werde er leicht unsicher und schwindelig. Im letzten Jahr habe die grobe Kraft vor allem auch im rechten Arm und Bein stark nachgelassen. Im letzten Jahr kann er nicht mehr vom Boden aufstehen, ohne sich zu stützen. Beim Aufrichten aus gebückter Haltung muß er mit den Armen an seinen Beinen „hochklettern“. Kein Alkoholgenuß, Nikotin mäßig. Keine infect. ven.

Befund: 1,75 großer Patient in gutem Ernährungszustand. Gewicht um 70 kg. Haut und Schleimhäute gut durchblutet.

Kopf: Normal configuriert, nirgends druck- oder klopfempfindlich. Nervenaustrittsstellen frei. Zunge nicht belegt. Gebiß intakt, mäßig gepflegt. Tonfillen und Rachenwand o.B. Am Hals keine Drüsen-schwellungen. Kehlkopf mittelständig. Struma angedeutet.

Thorax: Etwas flach, ausreichende Atemexkursionen. Lungen: Grenzen gut verschieblich. Auscultatorisch und percut. o.B.

Herz: relat. Grenzen: rechts 3 cm, links 9 cm oben 3 Rippe. Herztöne rein. Rhythmus regelmäßig, Puls weich.

Abdomen: Weich, leicht eindrückbar. Kein Druckschmerz, keine pathol. Resistenzen palpabel, nirgends Muskelfspannung. Leber und Milz: nicht vergrößert. Nieren und Genitale o.B.

Bewegungsapparat:

Reflexe:

Patellarsehnenreflexe beiderseits $\emptyset$

Achillessehnenreflexe beiderseits $\emptyset$

Alle anderen Reflexe sind in der normalen Stärke auslösbar. Keine pathologischen Reflexe nachweisbar. Sensibilität intakt. Romberg: $\emptyset$. Keine Ataxie. Die grobe Kraft der Beuger der unteren Extremitäten ist rechts mehr als links herabgesetzt. Das Gleiche gilt von den Quadrizeps und Glutaeus medius rechts und links. Die grobe Kraft des Iliopsoas ist links fast erhalten, dagegen rechts stark herabgesetzt. Beim Aufrichten klettert der Patient mit den Händen an den Oberschenkeln hoch. Mäßige Pseudohypertrophie der Waden, Atrophie der langen Rückenmuskeln mit leichter Lordose der Lendenwirbelsäule. Adduktoren der Beine sind nicht wesentlich gestört. Die grobe Kraft der Oberarmmuskeln ist ebenfalls herabgesetzt.

Wa. R. $\emptyset$. Blutk. Senkung 5—13.

Die Belastungsprobe mit 3,0 Kreatin ergab eine Ausscheidung von 60%.

Nr. 55—59. Enkel der Großmutter der beiden Muskeldystrophiker aus erster Ehe. Nr. 58 leidet an Asthma bronchiale. Die anderen Geschwister sind gesund.

Nr. 60. Schüler, gesund, nur an Kinderkrankheiten erkrankt gewesen.

- Nr. 61. 14 Jahre alt, gesund.
Nr. 62. Z. geb. H. Verheiratet, noch keine Kinder, gesund.
Nr. 63. A. H. Ledig, gesund.
Nr. 64. Im Säuglingsalter (2 J.) gestorben. Todesursache unklar.
Nr. 65. Schulkind. Bis heute stets gesund gewesen.
Nr. 66. Gesund.
Nr. 67—72. 6 Kinder der ältesten Schwester der beiden Muskeldystrophiker. 2 männliche, 4 weibliche. Die älteste Tochter Nr. 67 ist 18 Jahre alt, Nr. 72 10 Jahre. Alle Kinder sind gesund.
Nr. 73. Nr. 74. Ein Mädchen und ein Knabe im Schulalter. Gesund und normal entwickelt.
Nr. 75. Gefunder Knabe, ca. 13 Jahre alt.
Nr. 76. Schulkind, gesund.

Von den 76 Personen, die der Stammbaum E umfaßt, leben noch 37. In einer Familie erkrankten 2 Brüder an progressiver Muskeldystrophie. In der Ascendenz und Descendenz war kein weiterer Fall der gleichen Erkrankung mehr festzustellen. Ebenso war keine Verwandtenehe in der Ascendenz vorgekommen.

Beide Muskeldystrophiker erkrankten im juvenilen Alter. Zuerst war bei beiden der Beckengürtel befallen. Während bei dem älteren Kranken das Leiden sich auf Oberschenkel-, Rücken- und Beckenmuskulatur beschränkte, hat bei dem jüngeren auch die grobe Kraft der Oberarme nachgelassen. Homochronie ist ebenfalls nicht eindeutig; der ältere (Nr. 50) entdeckte die ersten Symptome erst im Alter von etwa 19 Jahren, bis dahin will er schwere Arbeit verrichtet haben, der jüngere (Nr. 54) merkte schon kurz nach der Schulentlassung ein Nachlassen der Kraft der Rückenmuskeln.

Wir haben hier im Stammbaum E ein ähnliches Bild vor uns wie im Stammbaum S. Zwei Geschwister erkrankten sporadisch, was als Auswirkung einer rezessiven Erbanlage aufzufassen ist.

Stammbaum Ei.

- Nr. 1. Geb. 1816, starb im Alter von 73 Jahren. Todesursache unbekannt. Litt an Gicht.
Nr. 2. Geb. 1822. Starb im Alter von 67 Jahren, angeblich an „Schlaganfall“.
Nr. 3. Erreichte ein hohes Alter. Todesursache nicht mehr feststellbar.
Nr. 4. Todesursache und Alter nicht mehr bekannt, soll nicht an „Lähmungen“ gelitten haben.

- Nr. 5. Geb. 1848, erreichte ein Alter von 70 Jahren, Todesursache unbekannt.
- Nr. 6. Geb. 1858, erreichte ein Alter von 65 Jahren. Krankheiten: „Herzneurose“ und Gicht.
- Nr. 7. Geb. 1860, wurde 62 Jahre alt.
- Nr. 8. Geb. 1862, gest. 1928. Hat zweimal geheiratet. Aus erster Ehe stammen 4, aus zweiter Ehe 1 Kind. Litt an Gicht. Tod durch Schlaganfall?
- Nr. 9. Geb. 1860. Starb im Alter von 39 Jahren. Todesursache unklar.
- Nr. 10. Gefund gewesen, Todesursache fraglich.
- Nr. 11. Außer an Kinderkrankheiten nie an ernstern Krankheiten gelitten.
- Nr. 12. War an Lues erkrankt.
- Nr. 13. War gefund.
- Nr. 14. Geb. 1877. Gestorben im Alter von 54 Jahren. Todesursache: „Gebärmutterkrebs“.
- Nr. 15. Geb. 1878, gestorben im Alter von 44 Jahren in einer Heilanstalt. Warum der Anstaltsaufenthalt nötig war, ist nicht mehr genau festzustellen, doch scheint es sich um Schizophrenie gehandelt zu haben.
- Nr. 16. Geb. 1900. Leidet an Asthma bronchiale.
- Nr. 17. Geb. 1903, gefund.
- Nr. 18. Gefund.
- Nr. 19. Geb. 1889, im Alter von 28 Jahren gestorben. War ein Idiot.
- Nr. 20. Geb. 1890. War nie ernstlich krank und ist auch heute gefund.
- Nr. 21. Geb. 1893, gefund, 2 Kinder.
- Nr. 22. D. E. Geboren 1896. Leidet an progressiver Muskeldystrophie. Anamnese: Patientin lernte im Alter von zwei Jahren laufen. Als Kind machte sie Scharlach und Masern durch. Später etwa im Alter von 23 Jahren erkrankte sie an einer schweren Grippe mit Lungenentzündung. Im Alter von 13 Jahren bemerkte Patientin zuerst, daß ihr das Turnen schwerfiel. Vor allem konnte sie nicht springen und am Pferd turnen. Trotz größter Energie konnte sie keinen Klimmzug machen. Während ihr früher diese Schwäche der Muskeln von ihrer Umgebung mehr als Faulheit ausgelegt wurde, trat nach der Geburt eines Kindes (1928) eine solche Verschlechterung der Bewegungsmöglichkeiten ein, daß ihre Erkrankung deutlich wurde. Durch einen Sturz auf der Treppe brach sich Patientin einen Oberarm. Im Anschluß ans Wochenbett 1928 entwickelte sich beiderseits eine Eileiterentzündung. Patientin fühlte sich hierdurch so schwach, daß sie ein Jahr lang weder stehen noch sitzen konnte. Eine Kur in Bad Münster brachte ihr langsame Erholung. Hiernach erfolgte eine

Gewichtszunahme von 15 kg, die nur auf strenge Diät hin wieder etwas zurückging. 1. Part. 1. Abort.

Jetzige Beschwerden: Schlechte Bewegungsmöglichkeit, besonders beim Aufrichten aus dem Liegen und Sitzen. Auch beim Gehen Schwierigkeit. Patientin kann schlecht Treppensteigen, ermüdet rasch. Der Kopf wird nicht gerne frei gehalten. Handarbeiten kann die Patientin gut erledigen. Bücken ist sehr erschwert. Gegenstände vom Boden aufheben ist unmöglich. Muskelschmerzen sind meist nicht vorhanden, höchstens einmal nach Überanstrengung. Alkohol und Nikotin $\emptyset$. Infect. ven. negat. Menarche: mit 13 Jahren, 28 (4—5), vorher etwas Kopfschmerzen.

Befund: 1,60 m große Patientin, Gewicht ca. 62 kg, guter Ernährungszustand. Mammae stark entwickelt. Brustumfang 88 cm. Haut und Schleimhäute mäßig durchblutet.

Kopf: Normal konfiguriert. Nicht druck- oder klopfempfindlich. Nerv. V und VII frei. Reichliche Kopfbehaarung. Sinnesorgane äußerlich o. B. Nasenatmung. Gebiß in Ordnung, gut gepflegt. Tonillen und Rachenwand o. B. Zunge feucht, nicht belegt, wird ohne Zittern herausgestreckt. Am Hals keine Drüenschwellungen, keine Struma. Der Kopf neigt zum hintenüberfallen, kann aber auch ohne Unterstützung gehalten werden.

Thorax: Die Brustwirbelfäule zeigt eine nach rechts convexe Skoliose. Lungen: Grenzen mäßig verschieblich, vorne 6. Rippe, hinten 10. B.W.D. Perkussion und Auscultation ergeben keinen pathologischen Befund. Die Röntgenaufnahme zeigt links Reste eines alten Oberlappenprozesses, gibt aber keinen Anhalt für einen akuten Prozeß. Herzkontur unten etwas ausladend.

Herz: rel. Grenzen: Rechts 2 cm, links 10 cm, oben 3. Rippe. Töne rein $A_2 = P_2$. Aktion regelmäßig, Puls gut gefüllt.

Abdomen: Bauchdecken weich, gut eindrückbar. Am linken Unterbauch in der Adnexgegend ist eine geringfügige Resistenz palpabel. Hier wird auch auf Druck Schmerz geäußert. Bruchpforten frei. Bauchumfang 80 cm. Leber und Niere nicht vergrößert, Nieren, äußere Genitalien o. B.

Bewegungsapparat:

Reflexe:

Patellarsehnenreflex bds. $\emptyset$.

Achillessehnenreflexe R. +, L. $\emptyset$.

Alle anderen Reflexe sind in normaler Stärke auslösbar. Keine pathologischen Reflexe vorhanden. Kein Tremor, keine Ataxie. Romberg $\emptyset$. Sensibilität intakt. Psychisches Verhalten normal.

Grobe Kraft der oberen Extremitäten, des Nackens und Schulter-

gürtels erhalten. Sämtliche Bewegungen der Lendenwirbelsäule, des Beckens und der Oberschenkel stark eingeschränkt. Die Füße können mit genügender Kraft gebeugt und gestreckt werden. Sichtbare Atrophie der langen Rückenmuskeln besonders im Bereich der Lendenwirbelsäule. Der Gang der Patientin hat etwas Watschelndes. Bei raschem Gehen wird das rechte Bein etwas nachgezogen. Starke Lordose der Lendenwirbelsäule. Um den Oberkörper nach vorne zu beugen, muß sich Patientin nach vorne fallen lassen. Beim Aufrichten stützt sie sich mit den Armen auf die Oberschenkel und klettert langsam hoch. Bei seitlichen Bewegungen des Oberkörpers erfolgt das Aufrichten durch den Schwung der Schultergürtelmuskulatur. Beim Hinlegen auf den Boden legt sich die Patientin zuerst auf die Seite. Beim Aufstehen setzt sie sich zunächst hin, wobei sie ausschließlich auf die Arme angewiesen ist, die sie fest auf den Boden stemmt. Dann erfolgt eine Drehung des Körpers unter Hochklettern mit den Händen an den Oberschenkeln bis zum aufrechten Knien. Jetzt werden die Beine einzeln mit den Händen aufgestellt und die Kranke klettert mit den Händen über Füße, Unter- und Oberschenkeln an sich selbst hoch. Wenn sich die Patientin ins Bett legen will, muß sie die Beine mit den Händen hochziehen. Wa.R. ♂. Blutkörp.-Senkung 10—20.

Kreatin: Gesamtkreatin 70,9 mg %

Präformiertes Kreatin 49,0 mg%.

Kreatin als Kreatinin 21,9 mg%.

Kreatinausscheidung nach Kreatinbelastung

am 14. 6. 1934: 53%

am 29. 7. 1934: 27%.

Nr. 23. Geb. 1891, gesund, verheiratet.

Nr. 24. Geb. 1895. Leidet an Diabetes mellitus. Zuerst im Alter von 18 Jahren festgestellt.

Nr. 25. Geb. 1899, gesund, verheiratet, ein Kind.

Nr. 26. Geb. 1888, befand sich zeitweise in Heilanstalten. Schizophrenie.

Nr. 27. Geb. 1890, gesund.

Nr. 28. Geb. 1899, gesund.

Nr. 29. Geb. 1903, gesund.

Nr. 30. Geb. 1929, gesund.

Nr. 31. Geb. 1929, gesund.

Nr. 32. Geb. 1923, gesund.

Nr. 33. Geb. 1925, nie ernstlich krank gewesen, ist nur sehr nervös und leicht aufgeregt.

Nr. 34. Geb. 1928. Seine Mutter leidet an progressiver Muskeldystrophie. Das Kind ist für sein Alter kräftig entwickelt. Das Kind litt

viel an Kinderkrankheiten, die aber rel. leicht auftreten und ohne Komplikationen heilten. Heute ist der Knabe gesund und bietet vor allem keinen Anhalt für Annahme einer Muskeldystrophie. Keine Muskelschwäche festzustellen, keine Muskeldefekte.

Nr. 34—38. 4 Söhne von Nr. 23. Alter ca. 17—22 Jahre. Stets gesund gewesen.

Nr. 39. Tochter des Diabetikers. Ist nie ernstlich krank gewesen. Eine ähnliche Störung wie bei ihrem Vater ist bei ihr nicht festzustellen.

Nr. 40. Gesund.

Nr. 41. Hydrocephalus, starb im Alter von 3 Monaten.

Nr. 42. Nr. 43. Alter 20—25 Jahre. Bis heute stets gesund gewesen.

Nr. 44. Gesund.

In vorliegender Sippentafel Ei. sind 44 Namen aufgeführt. Von diesen leben noch 29 Personen.

Eine Frau leidet an progressiver Muskeldystrophie. In der Sippe wird kein weiterer Fall des gleichen Leidens mehr gefunden. Auch der Sohn der Dystrophikerin ist gesund. Er steht allerdings noch nicht im Alter, in dem bei seiner Mutter die ersten Symptome des Leidens festgestellt wurden. Mehrere Verwandte der Kranken (väterlicherseits) haben an Gicht gelitten. Auffallend ist die Häufigkeit der Geisteskrankheiten (Schizophrenie und Idiotie) in dieser Familie. An weiteren Leiden treten Asthma bronchiale, juveniler Diabetes und Lues auf. Irgendein Kausalzusammenhang dieser Leiden mit der Muskeldystrophie ist jedoch nicht anzuerkennen. Die Kranke leidet an einer Muskeldystrophie mit initialen und hauptsächlichem Befall der Beckengürtelmuskulatur. Der Beginn des Leidens fällt ins juvenile Alter.

Aus diesen 4 Stammbäumen lassen sich natürlich keine brauchbaren Prozentzahlen errechnen. Nur sei noch einmal zusammengefaßt, daß in unserem Stammbaum Bi. das Leiden im Gefolge einer Blutverwandtenehe auftritt. Bei zwei Stammbäumen erkrankten 2 Geschwister. Diese Faktoren sprechen für Rezessivität. Ferner ist auffallend, daß 3 von den beschriebenen 4 Sippen (Stammbaum E, Stammbaum Ei und Stammbaum Bi) in einen landschaftlich kleinen Bezirk zusammenlaufen.

Wie ist nun zu erklären, daß neben Sippen mit geschlechtsgebunden-rezessivem und einfach rezessivem Erbgang noch Stamm-

bäume aufgestellt werden konnten, in denen die Muskeldystrophie eindeutig einem dominanten Erbgang folgt?

Minkowski-Sidler wollen beim genauen Studium des Schrifttums festgestellt haben: „daß die faziohumeralen Formen immer dominanten Erbgang aufweisen, (sie verweisen auf *Landouzy-Déjerine*, *Weitz*, *Diehl*, *Hansen*, v. *Ubisch*) während die Dystrophieformen mit initialer Beteiligung des Beckengürtels (Fälle von *Weitz*, *Moebius* und Beobachtungen von *Minkowski-Sidler*) sich rezessiv vererben.“ *Dawidenkow* und *Lenz* kommen zu gleichen Resultaten, wenigstens was die Dominanz der fazio-humeralen Form betrifft. S. o.

Die in vorliegender Arbeit beschriebenen Stammbäume, für die ich glaube, rezessiven Erbgang nachgewiesen zu haben, entsprechen den Beobachtungen von *Minkowski-Sidler*. Bei allen 6 Kranken dieser 4 Stammbäume sind entweder ausschließlich die Muskeln des Beckengürtels befallen, oder die Krankheit begann an diesen Partien und befiel sie stärker als andere Muskelgruppen.

Es wäre also bei allen Arbeiten über den Erbgang darauf zu achten, welche Muskelgruppen zuerst und ausschließlich befallen wurden. Dann ließe sich die Frage entscheiden, ob Muskeldystrophieformen mit vorwiegender Beteiligung der Beckenmuskeln, rezessiv, die infantile Duchenne'sche Pseudohypertrophie geschlechtsgebunden rezessiv und die faziohumeralen Formen vorwiegend dominant sind.

Wie stehen diese Beobachtungen zu der von *Erb* herausgestellten Einheitlichkeit der verschiedenen Untergruppen der Muskeldystrophie?

Landouzy-Déjerine forderten die Anerkennung der nosologischen Verschiedenheit der fazio-humeralen und der mehr den Beckengürtel befallenden Form der Muskeldystrophie. *Minkowski-Sidler* sind geneigt, ihnen Recht zu geben. Auch *Dawidenkow* tritt für eine Trennung dieser Unterformen der Muskeldystrophie in nosologischer Hinsicht ein.

In der neueren Literatur findet sich aber eine Ablehnung dieser scharfen Trennung: *Curtius*, *Curschmann*, *Oppenheim*, *Diehl-Hansen*, *Trömner* u. a. treten für die von *Erb* angenommene Einheitlichkeit des Leidens ein.

Man muß andererseits zugeben, daß mindestens zwei Formen der Muskeldystrophie beobachtet sind, die sich erbbiologisch unterscheiden. *Lenz*, der zwar für eine praktisch klinische Zusammengehörigkeit der Muskeldystrophieformen eintritt, glaubt, daß die Lehre *Erbs* wesentlich anders aussehen würde, wenn zu dessen Zeit schon die moderne Erblehre bestanden hätte. Er hält es für sicher, daß es genetisch verschiedene Biotypen der Muskeldystrophie gibt. Jeder Sippe komme ein bestimmter Durchschnittstypus zu, der entsprechend der individuell verschiedenen Erbmasse Abweichungen zeigen könne.

Curtius nimmt zur Erklärung der verschiedenen Erbgänge des feiner Meinung nach einheitlichen Leidens multiple Allelie an. Er vermutet fomit, daß die verschiedenen Varianten der Muskeldystrophie Mutation desselben normalen Gens darstellten: „auf diese Weise wären ihre biologische und klinische Ähnlichkeit, aber auch die familienweise verschiedenen Erbgänge ohne Schwierigkeit verständlich.“ Weiter nimmt er mit *Lenz* an, daß die phänotypische Variabilität durch individuelle Modifikationsfaktoren mitbestimmt wird.

Durch Einheirat anderer Stämme wird ja die Erbmasse der jüngeren Generationen wesentlich verändert, wodurch sich Verschiedenheiten im klinischen Bilde der Muskeldystrophie in den einzelnen Generationen erklären lassen.

Es ist also wohl an einer praktisch klinischen Einheitlichkeit der progressiven Muskeldystrophie festzuhalten. Erbbiologisch gibt es aber je nach Sippeneigenart verschiedene Formen, die sich vielleicht durch Befall bestimmter Muskelgruppen oder Alter des Beginns der Erkrankung phänotypisch dokumentieren.

Es sei noch einmal darauf verwiesen, daß die Sippentafeln der in dieser Dissertation aufgeführten Sippen in der Arbeit von *Kostakow-Bodarwe* im „Deutsch. Arch. f. klin. Med.“ 1938. abgebildet sind.

Verzeichnis des Schrifttums.

- Assmann: Dtsch. med. Wochenschr. 1934.
Bachmann, Fr.: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 92 (1926).
Bauer: Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. 176 (1922).
Bauer, J.: aus Handbuch der norm. u. pathol. Physiologie. Von Bethe-Bergmann u. a., Bd. 17.
Bauer-Fischer-Lenz: Menschliche Erblchkeitslehre und Rassenhygiene. Aufl. III u. IV, München, 1936.
Bergmann-Staehelin: Handbuch der inner. Medizin.
Bernhardt: Berliner klin. Wochenschr. Nr. 41.
Bing: Lehrbuch der Nervenkrankheiten.
Braunworth: Zentr. klin. Med. 78.
Barsikow: Berl. klin. Wochenschr.
Brauser: zit. nach Weitz. D.Z.f. Nerven. 72.
Curschmann: Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 21.
— Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 45 (1922).
— Med. Klin. 41 (1921).
— nach Bumke-Foerster: Handb. d. Neurologie.
Curtius, F.: Die Erbkrankheiten des Nervensystems. Stuttg. 1935.
Dawidenkow u. Krychowa: Zeitschr. f. gef. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 125, 1930.
Dell'Acqua, G.: Zentr. inn. Med. 83.
Diehl-Hansen-v. Ubisch: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 99, Bd. 105.
Däuffer: zit. nach Weitz. D.Z.f. Nerven. 72.
Davidson-Moebius: zit. nach Weitz. D.Z.f. Nerven. 72.
Dittrich: Verh. dtsh. orthop. Gef. (1931).
— Diss. Heidelberg, 1931.
Dziembowsky, v.: Dtsch. med. Wochenschr. 1917.
Doevenspeck: Wien. klin. Wochenschr. 1910.
Erb, W.: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 1 (1891).
— Arch. klin. Med. 34, (1884).
Feilchenfeld: Dtsch. med. Wochenschr. 1924.
Fischer: zit. nach Dittrich. Diss. Heidelberg 1931.
Finkelnburg: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 35 (1908).
Flinker, R.: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 134—135.
Friedmann: Zentr. f. gef. Neurol. u. Psychiatrie 28 (1922).
Funsten: Zentr. f. gef. Neurol. u. Psychiatrie 32 (1923).
Grothaus, El.: Arch. klin. Chirurg. 181 (1934).
Grünberg: Diss. med. Breslau 1928.
Gowers: zit. nach Grünberg. Diss. Breslau 1928.

- Hauptmann n: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 55, 63.
Hermann u. Kral: Med. Klin. 1927, 49.
Hoffmann u. Claus: Zeitschr. f. gef. Neurol. u. Psych. 106 (1926).
Jakob: zit. nach Curtius. Erbk. d. Nervensyst. 1935.
Jendrassik, E.: aus Handb. d. Neurol. v. Lewandowsky.
— Dtsch. Arch. f. klin. Med. 58, 61.
— Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 22.
Kostakow, St.: Klin. Wochenschr. 1934, 6.
— Dtsch. Arch. f. klin. Med. 34.
Kehrer, F.: aus Handb. d. Neurol. Bumke-Foerster.
Kollarits: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 30 (1906).
Kretschmer: Zeitschr. f. gef. Neurol. u. Psych. 36.
Kure, Ken u. a.: Zeitschr. f. d. experiment. Med. 47.
Krychowa u. Abowjan: Zeitschr. f. gef. Neurol. u. Psych. 150
(1934).
Krabbe, K.: Verh. neur. Gef. 1933.
Kraus-Brugsch: Spez. Pathol. u. Therap. Bd. 10, 1924.
Lenz: nach Bauer-Fischer-Lenz.
Linneweh, W. u. Fr.: Dtsch. Arch. klin. Med. 176 (1934).
Meggendorfer: zit. nach Curtius, f. o.
Michelsen: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 124.
Milhorat: Dtsch. Arch. klin. Med. 175.
Minkowsky-Sidler: Schweiz. med. Wochenschr. 1928.
Muller: zit. nach Lenz a. Bauer-Fischer-Lenz 1936.
Nägeli: Münch. med. Wochenschr. 1917.
Oppenheim, H.: Lehrb. d. Nervenkrankheiten.
Oransky, W.: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 99 (1927).
Pamboukis: Med. Klin. 1931, 6.
Pick: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 17.
Preiss: Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1901.
Riefe, W.: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 75.
Rohr: Med. Klin. 1923.
Rofe: Berl. klin. Wochenschr. 1916.
Runge: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 108.
Sacaze: zit. nach Weitz. D.Z.f. Nerven. 72.
Schenk: Berl. klin. Wochenschr. 1920.
Schlippe: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 30.
Scolari, E.: Zentr. f. d. gef. Neurol. u. Psych. 74.
Slauk: aus Bumke-Foerster: Handb. d. Neurol.
Slauk-Kostakow: Dtsch. med. Wochenschr. 1933, 5.
Smitt u. Smit: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 134—135.
Strube, G.: Med. Welt 1935.

- Strümpell: Lehrbuch d. inn. Medizin.
Thomas: Dtsch. med. Wochenschr. 19932, 1934.
Valentin u. Mestern: Dtsch. Ärztebl. 37, 1934.
Verschuer, v.: Dtsch. Ärztebl. 18. I, 1936.
Voormann, Joh.: Diss. Marburg 1935.
Watermann: Arch. f. orthop. u. Unfallchir. 22, 1923.
Westphal: Berl. klin. Wochenschr. 1926, 1927.
Wexberg: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 83.
Weitz: Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 72, 1921; 107, 1929.
-

Herrn Professor Dr. *Martini* danke ich für die Übernahme des Referates.

Zu besonderem Dank bin ich Herrn Dr. *Kostakow* für die Anregung zu dieser Arbeit, für die Überlassung des Materials und für die freundliche Unterstützung bei der Fertigstellung der Abhandlung verpflichtet.

Lebenslauf.

Am 20. Nov. 1923 wurde ich, Karl Arnold Bodarwé, als Sohn des Kreisbaumeisters Armand Bodarwé und seiner Ehefrau Kath. geb. Baum in Euskirchen geboren. Nach 3 Jahren Vorschule besuchte ich von 1923 bis 1932 das städt. Gymnasium in Euskirchen. Nach der Reifeprüfung im Jahre 1932 studierte ich Medizin in Bonn, München, Freiburg und wieder in Bonn. Die med. Vorprüfung legte ich 1934 in Bonn ab, die ärztl. Prüfung 1937 in Bonn.
